

3. melléklet. A faállomány-szerkezeti típusok elterjedése a Tési-fennsík déli részén I. M 1 : 20 000

- A lombszint záródása < 50%, jellemző a magascserjeszint, borítása >33%

A lombszint záródása < 50%, a cserjeszint borítása < 20%

A lombszint záródása 50-80%, a második lomszint borítása > 10%, jellemző a magas cserjeszint, borítása > 33%

A lombszint záródása 50-80%, a második lomszint borítása > 10%, jellemző a magas cserjeszint, borítása 20-33%

A lombszint záródása 50-80%, a második lomszint borítása > 10%, a cserjeszint borítása < 20%

A lombszint záródása 50-80%, a második lomszint borítása legfeljebb 10%, jellemző a magas cserjeszint, borítása > 33%

A lombszint záródása 50-80%, a második lomszint borítása legfeljebb 10%, jellemző a magas cserjeszint, borítása 20-33%

A lombszint záródása 50-80%, a második lomszint borítása legfeljebb 10%, jellemző az alacsony cserjeszint, borítása > 33%

A lombszint záródása 50-80%, a második lomszint borítása legfeljebb 10%, jellemző az alacsony cserjeszint, borítása 20-33%

A lombszint záródása 50-80%, a második lomszint borítása legfeljebb 10%, a cserjeszint borítása < 20%

A lombszint záródása > 80%, a második lomszint borítása > 30%, az alacsony cserjeszint a jellemző, borítása > 20%

A lombszint záródása > 80%, a második lomszint borítása > 30%, a cserjeszint borítása < 20%

A lombszint záródása > 80%, a második lomszint borítása 10-30%, a cserjeszintté > 33%

A lombszint záródása > 80%, a második lomszint borítása 10-30%, a magas cserjeszint jellemző, borítása 20-33%


A lombszint záródása > 80%, a második lomszint borítása 10-30%, a cserjeszintté < 20%
- A lombszint záródása > 80%, a második lomszint borítása < 10%, a magas cserjeszint a jellemző, borítása > 33%

A lombszint záródása > 80%, a második lomszint borítása < 10%, a magas cserjeszint jellemző, borítása 20-33%

A lombszint záródása > 80%, a második lomszint borítása < 10%, az alacsony cserjeszint jellemző, borítása > 33%

A lombszint záródása > 80%, a második lomszint borítása < 10%, az alacsony cserjeszint jellemző, borítása 20-33%

A lombszint záródása > 80%, a második lomszint borítása < 10%, a cserjeszint borítása < 20%



- Nyiladékok
- Fontosabb utak
- Szintvonalak
- Vágásterületek, nem záródott fiatalosok
- Szántók
- Gyepek
- Erdők

