

20. melléklet. A bükkösök és bükkelegyes erdők típusai vízgazdálkodás szerint a Tési-fennsík déli részén. M 1 : 20 000

Félnedves típusok, a gyepszintben üde erdei és zavarástűrő kétszikűek jellemzőek, és:

- A bükk aránya > 70%
- A bükk aránya 30-70%
- + A bükk aránya < 30%

Üde-félnedves típusok, a gyepszintre üde erdei hagymás-gumós egyszikűek jellemzőek, és:

- A bükk aránya > 70%
- A bükk aránya 30-70%
- + A bükk aránya < 30%

Üde-félnedves típusok, amelyek gyepszintjére nem, vagy nem kizárólag üde erdei geofitonok jellemzőek.

- A bükk aránya > 70%
- A bükk aránya 30-70%
- * A bükk aránya < 30%

Üde típusok, a gyepszintben az ökocsoportok és az életformák megoszlása változatos, és:

- A bükk aránya > 70%
- A bükk aránya 30-70%
- + A bükk aránya < 30%

Félszáraz bükkösök és bükkelegyes erdők:

- ▣ A bükk aránya > 70%, füvekben és sásokban, illetve sziklaerdei fajokban gazdag gyepszintű állományok
- ▣ A bükk aránya > 70%, a gyepszintben nem jellemzőek a füvek-sások, sziklaerdei fajok jelen lehetnek
- A bükk aránya 30-70%, gyakran füves állományok, többnyire üde és általános erdei fajokkal
- + A bükk aránya < 30%, a gyepszint összetétele igen változatos lehet

Száraz és igen száraz állományok:

- A bükk aránya > 70%, a gyepszintre szikla- és száraz erdei fajok jellemzőek

200 0 200 400 m

- Nyiladékok
- Fontosabb utak
- Szintvonalak
- Vágásterületek, nem záródott fiatalosok
- Szántók
- Gyepek
- Erdők

