

**NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM  
ERDŐMÉRNÖKI KAR  
VADGAZDÁLKODÁSI INTÉZET**

**ROTH GYULA ERDÉSZETI- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI-TUDOMÁNYOK  
DOKTORI ISKOLA  
VADGAZDÁLKODÁSI DOKTORI (Ph.D.) PROGRAM**

Írta:

**MAROSÁN MIKLÓS**  
okleveles agrármérnök  
vadgazda mérnök

**AZ ŐZ (*CAPREOLUS CAPREOLUS* (L.) 1758) EGYES KORBECSLÉSI  
MÓDSZEREINEK ÉS ÉLETKORRA UTALÓ BÉLYEGEINEK  
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE**

**DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS**

Tudományos vezető:

**Prof. Dr. habil. NÁHLIK ANDRÁS (Ph.D.)**  
egyetemi tanár

Sopron  
2004

**AZ ŐZ (*CAPREOLUS CAPREOLUS* (L.) 1758) EGYES KORBECSLÉSI  
MÓDSZEREINEK ÉS ÉLETKORRA UTALÓ BÉLYEGEINEK ÖSSZEHA  
SONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE**

Értekezés doktori (Ph.D.) fokozat elnyerése érdekében,  
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti- és Vadgazdálkodási-Tudományok  
Doktori Iskolája,  
Vadgazdálkodási doktori (Ph.D.) programjához tartozóan.

Írta:

Marosán Miklós

Témavezető: Dr. habil. Náhlik András (Ph.D.) egyetemi tanár

Elfogadásra javaslom (igen / nem)

(aláírás)

A jelölt a doktori szigorlaton 100 % -ot ért el,

Sopron,

.....

a Szigorlati Bizottság elnöke

Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom (igen /nem)

Első bíráló (Dr. ....) igen /nem

(aláírás)

Második bíráló (Dr. ....) igen /nem

(aláírás)

(Esetleg harmadik bíráló (Dr. ....) igen /nem

(aláírás)

A jelölt az értekezés nyilvános vitáján.....% - ot ért el

Sopron,

.....  
a Bírálóbizottság elnöke

A doktori (PhD) oklevél minősítése.....

.....  
Az EDT elnöke

**TARTALOM**

Oldal

1.	Bevezetés.....	5
1.1.	Célkitűzések .....	5
2.	Az őz korbecslési módszereinek és életkorra utaló bélyegeinek szakirodalmi áttekintése....	7
2.1.	Az élő őz terepi korbecslése.....	7
2.1.1.	Korbecslés az őz testfelépítése és viselkedése alapján.....	7
2.2.	Az őz korbecslése az agancs alapján.....	8
2.3.	Az elejtett őz korbecslése .....	10
2.3.1.	Az őz fogzatának jellemzése .....	10
2.3.2.	A fogváltás .....	12
2.3.3.	A fogkopás morfológiája.....	12
2.3.4.	A zápfogkoronák külső magassága .....	18
2.3.5.	A metszőfogkoronák kopása .....	18
2.3.6.	A metszőfogkorona és a fognyak aránya .....	19
2.3.7.	A metszőfogon kialakuló kopott felület hosszának és a korona nyelvi felületének aránya .....	20
2.3.8.	A metszőfogak szögállása .....	20
2.3.9.	A zápfogsor hossza.....	21
2.3.10.	A foghézag hosszának növekedése .....	21
2.3.11.	A fogak növekedési vonalainak vizsgálata .....	22
2.3.12.	Cementrétegek képződése .....	24
2.3.13.	A fogakban képződő pótdentin .....	26
2.4.	Egyéb korbecslési módszerek, és korra utaló bélyegek .....	27
2.4.1.	A koponyacsontok vastagsága és a varratok elcsontosodásának mértéke .....	27
2.4.2.	Az agancstő átmérője és szögállása .....	28
2.4.3.	A szívcsont hossza .....	28
2.4.4.	A szemlencse szárazanyag tartalma .....	29
2.4.5.	A pajzsporc csontosodása.....	30
2.4.6.	A rágóizom árka .....	30
2.4.7.	A trófeabírálati korbecslés .....	31
2.4.8.	A Rajnik-módszer .....	31
3.	Anyag és módszer .....	32
3.1.	A mintagyűjtési területek élőhelyi jellemzői .....	32
3.2.	A vizsgálati anyag .....	34
3.3.	A vizsgálat módszerei .....	35
3.3.1.	A fogkopás alapján végzett korbecslés .....	36
3.3.2.	A zápfogak külső magassága .....	36
3.3.3.	A metszőfogak hosszúsági paramétereinek vizsgálata.....	36
3.3.4.	A metszőfogak szögállása .....	37
3.3.5.	A fogsor hossza .....	37
3.3.6.	A foghézag hossza.....	38
3.3.7.	A szemlencsetömeg vizsgálata.....	38
3.3.8.	A cementállomány vizsgálata.....	39
3.3.9.	A pótdentin vizsgálata.....	41
3.3.10.	Szövetteni preparátumok készítése .....	41
3.3.10.1.	Dekalcinálás .....	42
3.3.10.2.	Kimosás, neutralizálás.....	42

3.3.10.3 .	Víztelenítés.....	42
3.3.10.4 .	Átderítés .....	43
3.3.10.5 .	Átitatás .....	43
3.3.10.6 .	Metszés.....	43
3.3.10.7 .	Festés.....	43
3.3.10.8 .	Elektronmikroszkópos preparátumok készítése .....	45
3.3.11.	A trófeabírálati korbecslés .....	46
3.3.12.	A terepi korbecslés .....	46
3.3.13	Az orrsövény elcsontosodása .....	46
4.	Az eredmények ismertetése és értékelése .....	47
4.1.	A cementállomány vizsgálatának értékelése.....	47
4.1.1.	A fogcsiszolatokon megfigyelhető cementzónák vizsgálatának értékelése.....	47
4.2.	A pótdentin-vizsgálatok értékelése .....	49
4.3.	A cementzónák alapján becsült kor és a fogkopás alapján becsült kor összehasonlítása .....	50
4.4.	A cementzónák száma alapján becsült kor és a trófeabírálati kor összehasonlítása .....	53
4.5.	A cementzónák száma alapján becsült kor és a terepen becsült kor eredményeinek összehasonlítása .....	56
4.6.	A terepen becsült kor és a trófeabírálati kor összehasonlítása .....	59
4.7.	A cementzónák alapján becsült kor és a Rajnik-módszer alapján becsült kor összehasonlítása .....	61
4.8.	A cementzónák száma alapján becsült kor és a mandibuláris zápfogkoronák külső magasságának összehasonlítása .....	62
4.9.	A cementzónák alapján becsült kor és az II-es fogak kapcsolata.....	72
4.10.	A fogszög vizsgálata .....	81
4.11.	A cementzónák alapján becsült kor és a fogsorhossz kapcsolata.....	85
4.12.	A cementrétegek alapján becsült kor és a foghíjas szélhosszának kapcsolata.....	88
4.13.	A cementrétegek alapján becsült kor és a szemlencse tömegének kapcsolata.....	91
5.	Megvitatás .....	95
5.1.	Korbecslés a cement- és a dentinállomány növekedési vonalai alapján .....	95
5.2.	A fogváltás .....	96
5.3.	A fogkopás .....	96
5.4.	A zápfogak koronamagassága.....	97
5.5.	A metszőfogak szögállása .....	97
5.6.	A szemlencse száraz tömege .....	98
5.7.	Az orrsövény elcsontosodása .....	99
5.8.	A trófeabírálati korbecslés .....	99
6.	Következtetések és javaslatok.....	100
6.1.	Következtetések és javaslatok a korbecslési módszerek kutatási célú alkalmazásához .....	100
6.2.	Következtetések és javaslatok a gyakorlati vadgazdálkodás számára .....	101
6.2.1.	Következtetések és javaslatok a terepi korbecsléshez.....	101
6.2.2.	Következtetések és javaslatok a trófeabírálati korbecsléshez .....	101
7.	Összefoglalás.....	103
8.	Tézisek .....	110
9.	Köszönetnyilvánítás .....	112
10.	Irodalomjegyzék.....	114
11.	Táblázatok jelmagyarázata.....	125

## 1. Bevezetés

A természetközeli vadállomány szabályozás, okszerű vadgazdálkodás kivitelezésekor az ökológiai és ökonómiai szempontokat is kielégítő vadállomány kialakításához, a vadgazdálkodási tervezéshez, a hivatalos trófeabírálathoz a korbecslési módszerek ismerete szükséges.

Magyarországon az ejtett trófeás nagyvad, így az őzbak ejtésének szakszerűségét a vadászati hatóság állapítja meg a hivatalos trófeabírálat során. Ezt a munkát az 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, a hozzátartozó 79/2004.(V.4.)FVM rendelet alapján az élőhelyi sajátosságok, a trófea értékmérő tulajdonságok, és a meghatározott életkor szerint végzik. Tehát az ejtés szakszerűségének megítéléséhez az életkor ismerete elengedhetetlenül szükséges. A vadászati hatóság a szakszerűtlen ejtést szankcionálja a jogszabály szerint, holott abszolút biztos kor megállapítása csak a fogváltás befejeződéséig, azaz 12 hónapos korig lehetséges (PRIOR, 1968). Egyéves kor felett az életkort biztosan meghatározni nem lehet, csak becsülhetjük a korbecslési módszerek segítségével és egyes korra utaló jegyek figyelembevételével.

### 1.1. Célkitűzések

Kutatásom célja, hogy a korábban jellemzően szubjektív módon, vélekedéssel értékelt korbecslési módszereket és korra utaló bélyegeket megvizsgáljam, és azok megbízhatóságát és jellemzőit egzakt módon matematikai-statisztikai (biometriai) elemzésnek vessem alá. Ennek eredményeképpen a korbecslési mód-

szerek megbízhatósága és pontossága megállapítható, amelynek alapján gyakorlati alkalmazhatóságuk objektív alapokon átgondolható.

Az alábbi vázlatpontokban bemutatom a vizsgálni kívánt problémákat:

- A cementzónák képződése és életkorbecslési felhasználhatóságának vizsgálata;
- A pótdentin képződése és életkorbecslési felhasználhatóságának vizsgálata;
- A fogkopás morfológiájának és életkorbecslési felhasználhatóságának vizsgálata;
- Fogváltás;
- Az élő őz terepi korbecslésének vizsgálata;
- A trófeabírálati korbecslés vizsgálata és a pontatlanság okainak feltárása;
- Az életkorra utaló morfológiai bélyegek vizsgálata.

Munkám során az alábbi kérdésekre kerestem a választ:

- A magyarországi habitatokban élő őz fogának cementállománya mutat-e életkorbecslésre alkalmas rétegződéseket?
- A magyarországi habitatokban élő őz fogának secundaer dentin állománya képződése során létrehoz-e életkorbecslésre alkalmas zónákat?
- A különböző korbecslési módszerek és korra utaló bélyegek mutatnak-e, és ha mutatnak milyen típusú és mértékű matematikai-statisztikai (biometriai) összefüggéseket?
- Hogyan minősíthetőek a vizsgált korbecslési módszerek és korra utaló bélyegek a gyakorlati vadgazdálkodási, a trófeabírálati hatósági tevékenység és a vadbiológiai kutatás szemszögéből?

## 2. Az őz korbecslési módszereinek és életkorra utaló bélyegeinek szakirodalmi áttekintése

Az őz korbecslésére nagyszámú pontosabb és kevésbé pontos módszert dolgoztak ki. E módszereket a teljesség igénye nélkül az alábbiakban mutatom be.

### 2.1. Az élő őz terepi korbecslése

Az élő őz életkorát testfelépítése, testtájainak arányai, viselkedése, illetve a bak esetében az agancs jellegének figyelembe vételével becsülik.

#### 2.1.1. Korbecslés az őz testfelépítése és viselkedése alapján

Az őzgidát a sutától kisebb testmérete alapján születésük évében könnyen megkülönböztethetjük. A fiatal sutákat az idősebbektől rövidebb fejük, karcsúbb alakjuk alapján különíthetjük el. A középkorúak zömökebbek, gömbölydedebbek (SZEDERJEI, 1940b), teltebbek, hát- és hasvonaluk közel párhuzamos (FARAGÓ és NÁHLIK, 1997). A öreg suták szikárabbak, csontjaik kiállóak, horpaszuk beesett. Az éves bak testalkata hosszúnak tűnő, nyaka vékony. A koponya keskeny és rövidebb, mint a kifejlett egyedeké, de a vékony nyak miatt a fej viszonylag nagynak tűnik (SZEDERJEI, 1959). Az életkor előrehaladásával egy ideig nő a testtömeg, erősödik a bak. A nyak vastagabb, és a bak egyre mélyebben hordja a fejét. A testalkat alapján tehát csak a korcsoportok elkülönítése lehetséges.

A fiatal egyed hangadása gyakori, többet riaszt és viselkedése játékos akár két-hároméves korig. Az öregek mozgása, viselkedése megfontolt, óvatos.

## 2.2. Az őz korbecslése az agancs alapján

Az agancs alapján is lehet az életkorra következtetni, de a korcsoportok elkülönítése ez alapján nagyon bizonytalan (FARAGÓ és NÁHLIK, 1997).

Az őzgida megszületését követően másfél hónappal kezdi el növeszteni az úgynevezett gidaagancsot, amely decemberre kifejlődik, és januárra hullajtja el (KŐHALMY, 1999).

Az egyéves őzbak nyársas, villás vagy akár hatos agancsot is felrakhat. Az agancstömeg különbsége egyéves korban, már akár három-négyszeres is lehet a gyenge és a jó agancsfejlesztő egyedek esetében (KŐHALMY, 1999).

A következő években a különbség a genetikai adottságoknak és a környezeti tényezőknek köszönhetően jóval jelentékenyebb is lehet az azonos korcsoportok között. A fiatal bak agancsának súlypontja annak felső harmadában van (vadásznyelven az erő felül van). A középkorú baknak az agancsa az elágazásnál és a szár koszorú felé eső részének vastagsága hasonló, az ágai hosszúak, hegyesedők. Az öreg bak agancsa általában a koszorúhoz közel a legvastagabb, ágai rövidek, hegyesek.

A koszorú vízszintes síkhoz képesti dőlése is támpontot nyújt a kor becsléséhez. Fiatalon mediális irányba lejtnek (V alak), középkorúaknál vízszintes, öregkorban laterálisan lejt a koszorú síkja (fordított V alak) (SZIDNAI, 1978). SZEDERJEI (1955) szerint a koszorúk szögállása nem utal az életkorra oly mértékben, hogy azt a korbecsléshez érdemben fel lehetne használni. Ennek ellenére ezt a módszert a trófeabírálati életkor meghatározásában jelentős hangsúllyal veszik figyelembe.



BÁN ET AL. (1986) kimutatták, hogy egyes trófea-értékmérő tulajdonságok, és az általuk tényleges életkornak nevezett hivatalos trófeabírálati kor között statisztikailag igazolható kapcsolat van. Vizsgálataik eredményét az alábbiakban összefoglalva mutatom be, kiegészítve a kritikus korrelációs koefficiens ( $r^*$ ) és a determinációs koefficiens ( $r^2$ ) értékével, amelyet a korrelációs koefficiens alapján számítottam ki.

1. táblázat\*

A kor és a trófea értékmérő tulajdonságok kapcsolata BÁN ET AL. (1986) nyomán kiegészítve

	Kor (x) és agancstömeg (y)	Kor (x) és agancstérfogat (y)	Kor (x) és szárhossz (y)	Kor (x) és összpontszám (y)
mintaelem szám	8124	8124	8124	8124
x átlag (év)	7,33	7,33	7,33	7,33
y átlag (g,cm <sup>3</sup> ,IP)	336,50	148,30	23,79	100,70
x szórása	2,23	2,23	2,23	2,23
y szórása	60,17	35,42	2,26	18,18
x relatív szórása (%)	30,38	30,40	30,38	30,38
y relatív szórása (%)	17,88	23,88	9,51	18,50
r	0,38	0,33	0,25	0,36
r* (p=0,05)	0,195	0,195	0,195	0,195
r <sup>2</sup>	0,14	0,11	0,06	0,13
függvény típusa	másodfokú parabola	harmadfokú parabola	harmadfokú parabola	másodfokú parabola

A korrelációs koefficiensek számított értéke minden esetben meghaladta a kritikus korrelációs értéket, így elmondható, hogy a kor és a fenti trófea értékmérő tulajdonságok között szignifikáns kapcsolat van. Az adatok szórása azonban olyan nagy, továbbá a korrelációs koefficiensek és ennek négyzetei a determinációs koefficiensek értékei olyan alacsonyak, hogy egy-egy trófea értékmérő tulajdonság ismeretében az életkor nem becsülhető meg egzakt módon.

A fenti bemutatás alapján belátható, hogy erős megbízhatósággal és éves pontossággal élő őz esetében a vadászterületen csak a születés évében, azaz gida korban tudjuk meghatározni az életkort. Egy éves korban a becslés már bizonytalansági tényezőkkel terhelt, például hatos bakok esetében nem tudjuk biztosan, hogy egy erős egyéves vagy viszonylag gyengébb kétéves példánnyal állunk

\* A táblázatok jelmagyarázata a 125. oldalon található

szemben. Az ennél idősebbek esetében már csak korcsoportba (fiatal, középkorú, öreg) tudjuk az egyedeket elfogadható megbízhatóság mellett besorolni.

### **2.3. Az elejtett őz korbecslése**

A lőtt vad életkorára csonttani (*osteologiai*), azon belül koponyatani (*craniologiai*) és fogtani (*odontologiai*) jellemzőknek az életkor növekedésével párhuzamosan bekövetkező változásai alapján következtethetünk.

#### **2.3.1. Az őz fogzatának jellemzése**

Az őz heterodont (anisodont) fogzatában metsző-, előzúp-, utózúp- és ritkán őzkampó (szemfog) található.

A metszőfogak (I, *dentis incisivi*) nyakalt, sík- vagy sokszor térgörbe fogak, amelyek csak az alsó fogsorban, az állkapocs (*mandibula*) metszőfogi részén (*pars incisivus*) lévő fogmedrekben (*alveoli*) helyeződnek. A felső fogsorban az állközötti csontban (*os incisivus*) metszőfogak nincsenek, helyettük elszarusodott hámsejtekkel fedett foglemez (*lamina dentalis*) található (SZÉKY, 1979; FEHÉR, 1980). Összehasonlító anatómiai szempontból az őznek 3-3 metszőfoga van, de ezekhez laterálisan csatlakozik egy-egy morfológiailag és funkcionálisan metszőfogként működő szemfog is. Tehát funkcionálisan 4-4 metszőfogról beszélhetünk az őz esetében. Elnevezésük mediolaterális irányban a következő:

- fogófog – I<sub>1</sub>
- belső közép- fog – I<sub>2</sub>
- külső közép- fog – I<sub>3</sub>
- szegletfog – I<sub>4</sub>

A felső szemfogak (C, *dentés canini*) őznél, melyek az őzkampó nevet viselik, csak ritkán fejlődnek ki. Amennyiben mégis kifejlődik, a felső fogsorban az állcsont (*maxilla*) rostralis fogmedrében található. Az állkapocsban, mint szegletmetszőfog (I<sub>4</sub>) található meg.

Az előzáfogak (P, *dentés praemolares*) az alsó és a felső fogsorban mind a két oldalon hármásával helyeződnek, azaz összesen az őz esetében 12 maradó előzáfog fejlődik ki.

Az utózáfogak (M, *dentés molares*) az előzáfogak mögött helyeződnek, számuk ugyanannyi, mint az előzáfogaké. Az utózáfogakat fejlődésük során tejfogak (*dentés lactei*) nem előzik meg.

Az őz fogképlete:

összehasonlító anatómiai szempontból

$$\frac{0\ 0\ 3\ 3}{3\ 1\ 3\ 3} = 32$$

funkcionális anatómiai szempontból


$$\frac{0\ 0\ 3\ 3}{4\ 0\ 3\ 3} = 32$$

ha az őzkampó is kifejlődik


$$\frac{0\ 1\ 3\ 3}{4\ 0\ 3\ 3} = 34$$

### 2.3.2. A fogváltás

Az őz fogainak váltódása SZEDERJEI (1955) szerint 13-14 hónapos korban, FARAGÓ (1994, 2002) szerint 12-13 hónapos korban, BIEGER (cit.: SZÉKY, 1979) szerint pedig 12 hónapos korban már befejeződik. PRIOR (1968) szerint a maradó fogak kihasadása és a praemolarisok váltódása egy éves kor előtt befejeződik.\*



Az őznek születéskor 20 tejfoga van. Először a metszőfogak váltódnak mediolaterális sorrendben 8 és 12 hónapos kor között. Ezt követően az előzáfogak apiconuchalis sorrendben 13-14 hónapos korokban váltódnak. Az első utózáfog ( $M_1$ ,  $M^1$ ) 3-4 hónaposan, a második utózáfog ( $M_2$ ,  $M^2$ ) 5-6 hónaposan, a harmadik utózáfog ( $M_3$ ,  $M^3$ ) 11-12 hónapos korban fejlődik ki (SZEDERJEI, 1955).



### 2.3.3. A fogkopás morfológiája

A fogkopása alapján történő korbecslés elterjedt eljárás az emlősök életkorbecslése során (MORRIS, 1972; GRANT, 1982, HABERMEHLE, 1985). Az őz esetében is gyakori módszer a fogkopás alapján végzett korbecslés (RIECK, 1970; SZABIK, 1973; WHITE, 1974; AITKEN, 1975; ASHBY és HENRY, 1979; HRABE és KOUBEK, 1987; HEWISON ET AL., 1999). A hivatásos és a sportvadász, a trófeabíró és a vadbiológus egyaránt figyelembe veszi, a fogkopás mértékét a korbecsléskor. A fogkopás alapján végzett korbecslést célszerű nem csak egy-egy kiemelt fog viz-

\* Az értekezésben szereplő összes fényképet a szerző készítette

gálatával végezni, hanem az egész fogazat kopottságát kell megvizsgálni, hogy a kor minél pontosabban becsülhető legyen.

A fogkopás mértékének segítségével végzett korbecslést KŐHALMY (1999) szerint először NIETSCHE (1890) alkalmazta a metszőfogak alapján. Később a zápfogak kopottságát is már figyelembe vette NEHRING (1903), majd BIEGER (1933).

A fogkopás alapján elvégzett korbecslés BIEGER (1939, cit.: Meák és Szederjei, 1957) szerint 50 %-ban ad pontos eredményt. MEÁK és SZEDERJEI, (1957) szerint ennek az az oka, hogy egy meghatározott őzpopulációkból származó vizsgálati anyag alapján kidolgozott módszert más területeken adaptálás, kiegészítés nélkül alkalmazzák. Vélelmezhető, hogy ha e módszert a vizsgált állományok adottságainak figyelembe vételével átdolgozzák, a pontosság javítható, akár 70-80 % is lehet.

RIECK (1970) szerint a fogkopás mértékének ismerete érdekes információ a kor becslésekor, de a megbízhatósága nem mindig megfelelő.

SZABIK (1973) kétszáz egyedre kiterjedő vizsgálata során a cementállományban lévő zónák alapján becsült korhoz viszonyította a fogkopás alapján becsült kort azt találta, hogy a fiatal (1-4 éves) korosztályok esetében átlagosan egy, az idősebb (5-9 éves) korosztályoknál 2-4 év átlagos eltérés volt megfigyelhető.

AITKEN (1975) tapasztalata szerint a cementzónák alapján becsült kor és a fogkopás alapján becsült kor 63,5%-ban egyezett meg, és 90,5%-ban egy éven belül volt eltérés a két módszerrel becsült kor között.

CEDERLUND ET AL. (1991) ismert korú egyedek vizsgálatával arra a megállapításra jutott, hogy a fogkopás alapján végzett becslés az esetek 68%-ában ad évre pontos eredményt.

HEVISON ET AL. (1999) vizsgálata alapján a fogkopás alapján végzett korbecslés  $\pm 1,02$  év átlagos eltéréshez vezet, de előfordult -5 és +6 év eltérés is.

Hazánkban az őz fogkopása alapján dolgozott ki korbecslési eljárást SZEDERJEI (1940a; 1955; 1959), amely módszert SZIDNAI (1978) és SZÉKY (1979) kis mértékben módosított.

Az alábbiakban bemutatott összeállítást 7 éves korig AITKEN (1975), 8 éves kor felett HRABE ÉS KOUBEK (1987) javaslata alapján BLASE (1960) leírását felhasználva, SZEDERJEI (1959) és SZIDNAI (1978) nyomán módosítva, továbbá a trófeabírálatokon megfigyelt korbecslési gyakorlat alapján állítottam össze. A leírást követő szemléltető fotókat a fogcsiszolatok alapján becsült kor utólagos értékelésével készítettem.

- **Egyéves** (másodfű) – A  $P_1$ -en kopás nem látható. A  $P_2$ -n és  $P_3$ -on a fogváltást követően kopás csak néhány hét esetleg egy hónap múlva alakul ki. Az  $M_1$  és  $M_2$  fogcsipkéinek élén lekopott a zománc, a feltáródott barna pót dentin már látható. Az  $M_3$ -nál ugyanez figyelhető meg, de a kisebb mértékű kopás a fog hátsó oszlopára nem terjed ki.
- **Kétéves** (harmadfű) – A  $P_1$ -en kopás általában nem látható. A  $P_2$  kissé kopott, a kopás hátul erősebb, a pót dentin rajzolata már kivehető. A  $P_3$  elől-hátul kopott, a rajzolat is látható. Az  $M_1$ -en a csúcsok és az élek nagyon élesek, a külső rajzolat jellemzően háromszögletű, a hasadék kivehető. Az  $M_2$  élein a kopás jól látható, a külső rajzolat szélesedik, a hasadék jól érzékelhető. Az  $M_3$  hátsó csúcsa általában alig kopott.
- **Hároméves** (negyedfű) – A  $P_1$  caudalis része esetenként kopott. A barna pót dentin már esetleg látszik. A  $P_2$  külső része erősebben kopott, a  $P_3$ -on határozott kopás látható a rajzolatok majdnem összeérnek. Az  $M_1$  rágófelületének külső éle már nem éles, erősen kopott, a barna pót dentin há-

romszögletű. Az  $M_2$  rágófelületének külső éle megkopott, a külső rajzolata háromszögletűvé szélesedik. Az  $M_3$  hátsó csúcsa alig kopott.

- **Négyéves** (ötödfű) – A  $P_1$  hátsó része sokszor már kopott. A  $P_2$  és a  $P_3$  erősebben kopott. Az  $M_1$  külső éle erősebben megkopott, belső éle is határozott kopást mutat. Az  $M_2$  és az  $M_3$  külső éle erősebben megkopott, belső éle is érdemi kopást mutat.



3. kép. Fogkopás 1 éves korban



4. kép. Fogkopás 2 éves korban



5. kép. Fogkopás 3 éves korban



6. kép. Fogkopás 4 éves korban

- **Ötéves** (hatodfű) – A  $P_1$  hátsó része jellemzően már kopott. A  $P_2$  külső és belső csúcsai erősen kopottak, a pótdentin a rágólap felületének nagy részén látható. A  $P_3$  belső csúcsai is nagyon kopottak. A feltáródott barna pótdentin a rágólap felületének nagy részén látható. Az  $M_1$  valamennyi csúcsa erősen kopott, a két belső csúcs bőven a rágófelület fölé emelkedik, a zománcredő nagy része elkopott. Az  $M_2$  és az  $M_3$  rágófelülete erősen kopott, de a rágófelületeik élei nem laposak, a belső csúcsok határozottan ki emelkednek, a külső csúcsok kevésbé emelkednek ki, a rajzolat nagyrészt egybefolyik.

- **Hat éves** (hetedfű) – A  $P_1$  rágófelületének hátulsó része jellemzően erősen kopott. A  $P_2$  rágófelülete erősen kopott, a csúcsok gyakorlatilag lekoptak, a zománcredők még látható. A  $P_3$  rágófelülete erősen kopott, de a zománcredő még jól látszik. Az  $M_1$  csúcsai teljesen lekoptak, a zománcredő még látszik, de szakadozott. Az  $M_2$  csúcsai nem koptak le teljesen, a zománcredő még látszik, de szakadozott. Az  $M_3$  rágófelülete lekopott, de a zománcredő még összeér.
- **Hét éves** (nyolcadfű) – A  $P_1$  rágófelületének hátulsó része homorúra kopott. A  $P_2$  csúcsai lekoptak, a zománcredők maradványai még láthatók. A  $P_3$  csúcsai lekoptak, a zománcredők maradványai szakadozottak, de még láthatóak. Az  $M_1$  zománcredőinek maradványai részben már hiányoznak. Az  $M_2$  zománcredőinek maradványai már szakadozottak. Az  $M_3$  zománcredőinek maradványai szakadozottak, de a zománcredő még összeér.
- **Nyolc és kilenc éves** (kilenced és tizedfű) – A  $P_1$  rágófelületének hátsó része homorúra kopott. A  $P_2$  rágófelülete úgy lekopott, hogy a zománcredőinek maradványai már alig vehetők ki. A  $P_3$  zománcredőinek maradványai eltűntek. Az  $M_1$  homorúra kopott zománcredőinek maradványai már hiányoznak, rágófelülete a többi fog rágófelülete alá kopott. Az  $M_2$  zománcredőinek maradványai részben, esetleg már teljesen hiányoznak. Az  $M_3$  zománcredőinek maradványai szakadozottak, részben már hiányoznak.
- **Tíz éves és idősebb** – A kopottság az összes fog esetében egyre erőteljesebb. Egyes fogrészek, fogak le is töredezhethetnek, idővel ki is hullhatnak.





7. kép. Fogkopás 5 éves korban



8. kép. Fogkopás 6 éves korban



9. kép. Fogkopás 7 éves korban



10. kép. Fogkopás 8 éves korban



11. kép. Fogkopás 9 éves korban



12. kép. Fogkopás 10 éves korban

A fogkopáson alapuló korbecslési módszer alkalmazásának hátránya, hogy az eltérő takarmányt felvevő őz fogazata feltételezhetően nem azonos mértékben kopik. A fogkopás mértékét befolyásolhatja a talaj fizikai félesége, mivel a takarmánnyal felvett homok feltehetően jobban koptatja a fogat, mint például az agyag. Mindezek mellett feltételezhető továbbá az is, hogy egyes egyedek fogai jobban

kopnak, mint másoké, aminek oka részben a takarmány-felvételi szokásokban (SZABIK, 1973) részben az egyedi fogkeménység különbségében keresendő. Az azonos életkorban eltérő mértékű fogkopottságot fiziológiai, genetikai, etológiai és a környezeti tényezők hatása együttesen alakítja ki.

#### **2.3.4. A zápfogkoronák külső magassága**

A zápfogak koronái az életkor előrehaladtával folyamatosan kopnak. Ezért a fogkorona magasságok folyamatosan csökkennek.

ASHBY ÉS HENRY (1979) 56 vegyes ivarú őz vizsgálatakor lineáris regresszióanalízissel értékelte a becsült kor és a mandibuláris M<sub>1</sub>-es fogak koronamagasságának kapcsolatát. Eredményük szerint a másfél és a hat éves kor közötti értelmezési tartományban a korrelációs koefficiens ( $r=-0,86$ ) abszolút értéke igen magas. Ez szoros, statisztikailag igazolható kapcsolatot jelent.

CEDERLUND ET AL. (1991) 71 ismert korú őzből származó mandibula vizsgálatánál, a kor és az M<sub>1</sub>-es fogak koronamagasságának regressziójánál, a korrelációs koefficiens értéke  $r=-0,66$ -nak bizonyult, ( $r^2=0,44$ ; DF=69; P<0,0001).

STUBBE ÉS LOCKOW (cit.: VARGA, 1996) 277 db őz megvizsgálása során az M<sub>1</sub>-es fogak fogkorona-magassága és a becsült életkor között szoros negatív korrelációt talált. A kapcsolat szorosságát jól jellemzi, a korrelációs koefficiens számított értéke ( $r= -0,855$ ). Ennek alapján kiszámítottam a determinációs koefficiens értékét ( $r^2=0,731$ ), amelynek százszorosa megmutatja, hogy az életkor változása a vizsgált mintán átlagosan 73,1 %-ban befolyásolta a fogkorona magasságát.

#### **2.3.5. A metszőfogkoronák kopása**

A táplálék leharapásakor kopnak a metszőfogak koronái. Ezáltal a metszőfogkoronák megfigyelésével szintén tájékozódhatunk az életkorról. STRŐZE (cit.: SZEDERJEI, 1955) erre az alábbi 2. táblázatban bemutatott módszert dolgozta ki.

## 2. táblázat

A metszőfogak kopása alapján történő korbecslés  
STRŐZE (cit.: SZEDERJEI, 1955) nyomán

Életkor (év)	Az I <sub>1</sub> fog jellemzése
1	Az I <sub>1</sub> metsző éle erősen domború
2	Az I <sub>1</sub> metsző élének laterális része az I <sub>2</sub> felé hajlik
3	Az I <sub>1</sub> éle még domború, de kissé hullámos
4	Az I <sub>1</sub> éle még domború, de hullámos
5	Az I <sub>1</sub> éle csaknem egyenes
6	Az I <sub>1</sub> éle egyenes
7	Az I <sub>1</sub> éle a többi I fog metsző éle alá kopott

A fenti leírásnál objektívebb adatok nyerhetők, ha a metszőfog koronamagasságát megmérjük.

A gímszarvasnál EIDMANN (1932) végzett ilyen vizsgálatokat, amely során kimutatható kapcsolatot talált a metszőfog (I<sub>1</sub>) koronamagassága és az életkor között. Hazánkban MAROSÁN (1999) 51 db gímszarvas vizsgálatánál statisztikailag igazolható kapcsolatot mutatott ki ( $r=-0,751$ ;  $r^*=0,273$ ;  $r^2=0,565$ ;  $P=0,05$ ;  $DF=50$ ).

### 2.3.6. A metszőfogkorona és a fognyak aránya

A metszőfogkorona magassága az életkor emelkedésével a fent említett okok miatt csökken, a fognyak hossza ellenben nő. A növekedés oka, hogy a metszőfog – ha kis mértékben is – egyre jobban kitolódik a fogmederből. Ehhez hozzájárulhat a foggyökércsúcson (*apex radialis dentis*) jelentősen gyarapodó cementállomány. Az előző folyamatot a fogmederperem esetleges pusztulása tovább fokozhatja. Mindezek miatt a fogkorona és a fognyakhossz hányadosa az életkor növekedésével csökkenést mutat, tehát fordítottan arányos.

Ez a jelenség megfigyelhető a gímszarvasnál is (SZEDERJEI, 1960). MAROSÁN (1999) a gímszarvas életkora és a fogkorona/fognyak arányának korrelációanalízisével szignifikáns kapcsolatot mutatott ki ( $r=-0,713$ ;  $r^*=0,273$ ;  $r^2=0,508$ ;  $P=0,05$ ;  $DF=50$ ).

### 2.3.7. A metszőfogon kialakuló kopott felület hosszának és a korona nyelvi felületének aránya

Megfigyeléseim alapján amint gímszarvasnál, úgy őznál is a metszőfogon kialakuló kopott felület hossza a korrallal növekszik, miközben a kopásmentes rész egyre kisebb lesz. Amennyiben a kopott rész hosszát elosztjuk az egész belső nyelvi koronai felülettel olyan arányszámot (indexet) kapunk, amely utalhat az életkorra. Gímszarvasnál szignifikáns összefüggést mutatott ki ( $r=0,598$ ;  $r^*=0,273$ ;  $r^2=0,358$ ;  $P=0,05$ ;  $DF=50$ ) az életkor és az előbb leírt módon képzett arányszám között MAROSÁN (1999). Hasonló vizsgálatokat végzett HELL (1976, cit.: KŐHALMY, 1999) vaddisznónál.

### 2.3.8. A metszőfogak szögállása

Azért, hogy a metszőfogak kopásuk ellenére funkciójukat minél jobban megtarthassák, a kor és a fogkopás mértékének növekedésével az állkapocs alsó (*ventralis*) síkjával bezárt szögük növekszik. Ennek oka, hogy az állkapocs metszőfogi részének (*pars incisiva*) alsóajki felülete (*facies labialis*) némileg növekszik. BIEGER (1939 cit.: KŐHALMY, 1999) vizsgálatának eredményét, amely őznál az életkor és a metszőfogak dőlésszögének kapcsolatát elemzi a 3. táblázatban mutatom be.

## 3. táblázat

A metszőfogak dőlésszögének változása őznél  
BIEGER (1939 cit.: KŐHALMY, 1999) nyomán

Életkor (év)	Metszőfogak dőlésszöge (°)
1	53
2	55
3	58
4	60
5	63
6	65
7	66
8	67
≥9	70

### A zápfogsor hossza

A kifejlett őz zápfogsorának hossza, az életkor előrehaladtával rövidül. A rövidülés okai SZEDERJEI (1955) szerint:

- Az életkor gyarapodásával szorosabban illeszkednek a fogak egymáshoz;
- A zápfogak ék alakúak, így a korona kopásával a fogsorhossz is csökken;
- A szomszédos fogak gyökerei és fognyakai közötti eredetileg körülbelül 2 mm-es távolság az életkor növekedésével csökken;
- A 3 gyökerű harmadik tejelőzápfog ( $p_3$ ) hosszabb, mint a maradó harmadik előzápfog ( $P_3$ ).

SZUNYOGHY (1963) megállapítása, amely szerint a gímszarvasnál a fogak fogmederből történő kitolódásával a fogsorhossz rövidül, feltehetően az őzre is igaz. Ugyancsak megfigyelhető az őznél is MAROSÁN (1999) gímszarvasra tett megállapítása, miszerint összekopnak a fogak egymás felé tekintő felületei (*facies contactus*) és ez is hozzájárul a fogsorhossz rövidüléséhez.

### A foghézag hosszának növekedése

A foghézag (*diasthema*), más néven a foghíjas szél (*margo interalveolaris*) az állkapocs szegletmetszőfoga és az első előzápfoga között húzódó fogmeder mentes csontszegély.

Az életkor előrehaladása során az emlős fajok egy részénél, egy ideig a diasthema hossza növekvő tendenciát mutat. Ez a jelenség megfigyelhető őznél is. Erre vonatkozó vizsgálatokat végzett AITKEN (1975), de eredményeit csak egy grafikonon mutatja be, sem konkrét adatokat, sem statisztikai értékelést nem közölt. A grafikonjáról annyi mindenesetre leolvasható, hogy a születés évében jelentős diasthema hossznövekedés figyelhető meg, és egyéves kor után a növekedés üteme jelentősen lelassulva folytatódik.

A gímszarvasnál az életkor előrehaladtával statisztikailag igazolható hossz-növekedést talált SZUNYOGHY (1963). MAROSÁN (1999) 48 gímszarvasbika megvizsgálásával az életkor és a foghézaghossz között közepes erősségű statisztikailag igazolható összefüggést talált ( $r= 0,644$ ). Mindezek alapján feltételezhető, hogy e paraméter az őznél is kapcsolatban van az életkorról.

### **A fogak növekedési vonalainak vizsgálata**

A cement- és a dentin-állomány gyarapodása során sávokat képez, amelyek száma az életkorról kapcsolatba hozható, s így a cementum és a dentin értékelése különböző mikroszkópos vizsgálattal a kor becslésére felhasználható (FISHER és MACKANZIE, 1954; KLEVEZAL és KLEINENBERG, 1967; NAGY és SZÉKY, 1995).

A fogakban található növekedési vonalak életkorbecslési alkalmazásáról elsőként EIDMANN (1932) számolt be gímszarvassal kapcsolatos közleményében. Később medvefókán (*Callorhinus ursinus cynocephalus*) vizsgálta SCHEFFER (1950), elefántfókán (*Mirounga leonina*) LAWS (1952). Azt, hogy jávorszarvas fogainak cementállományban, az életkorra utaló számú sávok, zónák találhatóak, elsőként SERGEANT és PIMLOTT (1959) publikálták. LOW és COWAN (1963) szarvasfélék cement-állománya alapján becsültek kort, és még ugyanebben az évben megjelent MCEVEN (1963) karibu, és MITCHELL (1963) gímszarvas cementállomány vizsgálatával foglalkozó életkorbecslési cikke. Ezt követően sorozatosan jelentek

meg a fogak szövettani szerkezetét értékelő életkorbecslési célú vizsgálatokkal foglalkozó tanulmányok.

Virginiai (fehérfarkú) szarvassal (*Odocoileus virginianus*) illetve öszvér-szarvassal (*Odocoileus hemionus*) ROBINETTE ET AL. (1957), WOOD (1962), BRIAN (1966), RANSOM (1966), GILBERT (1966), SOHN (1968), ERICKSON és SELIGER (1969), LOCKARD (1972), TOMAS és BANDY (1973), KAY (1974) és RICE (1980) munkái foglalkoztak.

Rénszarvas (*Rangifer tarandus*) korbecsléssel MILLER (1974) és GORDON (1988) foglalkozott.

Jávorszarvas (*Alces alces*) korbecsléssel SEVERINGHAUS (1949), WOLFE (1969), KEISS (1969), GASSAWAY AT AL. (1978) és CUMMING és EVANS (1980) munkái foglalkoztak.

Gímszarvassal (*Cervus elaphus*) kapcsolatosan QUIMBY és GAAB (1957), MITCHELL, (1967) LOWE (1967), DOUGLAS (1970), KLEIN ET AL. (1981), BROWN és CHAPMAN (1991), KIERDOF és BERCHER (1997) és MAROSÁN (1999, 2000, 2001a) publikálták tapasztalatikat.

Szikaszarvassal (*Cervus nippon*) kapcsolatos korbecslésről UCKERMANN és SHOLZ (1971), BRIEL (1979) és BARTOS ET AL (1984) közöltek adatokat.

Őznél (*Capreolus capreolus*) végzett, a fog növekedési vonalainak értékelésével is foglalkozó tanulmányt készített PRIOR (1968), BAZIS (1971), ALMASSAN (1972), SZABIK (1973), WHITE (1974), AITKEN (1975), BRIEL (1979), ASHBY és HENRY (1979), HRABE és KOUBEK (1987), FELEK (1987), CEDERLUND ET AL. (1991), KOVÁCS és FELEK (1991), HEVISON ET AL. (1999) MAROSÁN (2001b, in press) és MAROSÁN és GERGÁTZ (2001).

Carnivora fajok korbecslését STONEBERG és JONKEL (1966), GRUE (1976), GRUE és JENSEN (1973, 1976) és HARRIS (1978) vizsgálták más szerzők mellet.

Trópusi fajoknál végzett korbecslésről SPINAGE (1976) számolt be.

A régészeti állattannal kapcsolatos korbecsléssel foglalkozó tanulmányt publikált CASTEL (1975), MAYHEW (1978), COY ET AL. (1982), STALLIBRASS (1982), SAVILLE és BEATTIE (1983), STAN (1989), GORDON (1993), MONKS és ROBERT (1993), PIKE-TAY (1991, 1995) és CARTER (1998).

Humán vonatkozásokkal kapcsolatosan többek között CHARLES ET AL. (1986), CONDON ET AL. (1986), KVAAL ET AL. (1996) és SZIKOSSY ET AL (2003) publikálták tapasztalataikat.

Átfogó tanulmányokat KLEVEZAL és KLEINBERG (1967), GRUE és JENSEN (1979), MORRIS (1972), FANCY (1980), KLEVEZAL (1996) és SIGRID ET AL. (1996) állítottak össze.

### **Cementrétegek képződése**

A fogak nyakát és gyökerét cementállomány borítja (ÁBRAHÁM, 1964; HOLLÓSI, 1995; HUSVÉTH, 2000; HILLSON és BOND, 1996 NÉMETH és L. KISS, 2002). A cementállomány az életkor növekedésével vastagszik (FANCY, 1980, GUZSAL, 1981; HILLSON, 1986;). Ez a vastagodás a metszőfogak esetében a gyökércsúcsnál, a zápfogak esetében a gyökérívnél és a gyökércsúcsnál a legerősebb.

A cementum korbecslési célú vizsgálata során három eljárás alkalmazható (FANCY, 1980).

Az egyik módszer szerint a zápfogak valamelyikén – általában az M<sub>1</sub>-en – transzverzális síkban a gyökéríven csiszolatot készítünk, a felületet polírozzuk, s majd sztereomikroszkóp alatt a cementzónák száma alapján becsüljük a kort.



A másik módszer esetében valamelyik zápfog gyökérívén vékony átvilágítható csiszolatot készítünk – megfelelő csiszoló berendezéssel – s a preparátumot labormikroszkóppal értékeljük. A gyakorlatban ez a módszer nem terjedt el.

A harmadik eljárás során a vizsgált fogat – jellemzően az I<sub>1</sub>-et és az M<sub>1</sub>-et – dekalcinálni kell, majd beágyazni, metszeni és hisztotechnikai eljárással festeni. Ezt követően a metszetet labormikroszkóppal lehet vizsgálni. E három módszer csak technikailag különbözik, mivel ugyanazt a morfológiai képletet értékeli különböző eljárásokkal.

SZABIK (1973) a cementumban megfigyelhető zónák alapján végzett korbecslést tartja a legpontosabb eljárásnak, és összehasonlító vizsgálatainak alapját is ez az eljárás képezi.

AITKEN (1975) ismert korú őzek vizsgálatával, hasonlóan LOW és COWAN (1963) ismert korú karibunál és MITCHELL (1963, 1967) ismert korú gímszarvasnál, végzett vizsgálata során pontos, jól használható korbecslési eljárásnak minősítette a cementállomány fogcsiszolat segítségével történő értékelését, az M<sub>1</sub>-es fogaknál. Kutatásának eredményeként megállapítja, hogy az őznél a nyári (vegetációs) időszakban vastagabb fehér, sejtdús sáv képződik a cementumban, míg télen (a vegetációs időszakon kívül), általában januártól egy vékonyabb sötétebb sáv látható.

Egy németországi vizsgálatban BRIEL (1979) az őznél életkorra utaló zónákat a cementállományban mindössze 11 %-ban talált. Feltételezhető, hogy Magyarországon a kontinentális klíma miatt ez az arány jobb, mint Németországban, ahol az óceáni éghajlat kiegyenlítő hatása jobban érvényesül.

FELEK (1987) szoros összefüggést talált az M<sub>1</sub>-es fogak dekalcinált metszetein megszámlolt cementzónák alapján a valódi kor és becsült kor között.

CEDERLUND ET AL. (1991) szintén ismert korú őzek vizsgálatával, az M<sub>1</sub>-es fogak csiszolatain megfigyelhető cementzónák száma alapján végzett korbecsélést a fogkopás alapján végzett korbecsélésnél pontatlanabbnak találta. Vizsgálatában a valódi korról a cementzónák alapján becsült kor 46%-ban egyezett meg, ellenben a fogkopás 68%-ban mutatott azonosságot.

KOVÁCS ÉS FELEK (1991) a valódi életkor és az M<sub>1</sub>-es fogak dekalcinált metszeteinek cementzónái alapján becsült kor között szignifikáns kapcsolatot talált ( $r=0,8622$ ;  $n=9$ ;  $P<0,001$ ).

Hazánk területén gyűjtött mintákban MAROSÁN (1999) gímszarvasnál végzett vizsgálatában 95,28 %-ban talált olyan korra utaló sávokat a cementumban, amely alapján az életkor becsülhető volt.

### **A fogakban képződő pótdentin**

A fogak használatuk során kopnak. A kopás először a fogak rágófelületén (*facies occlusialis*), a metszőfogaknál a metsző élen, a zápfogaknál a csúcsokon, éleken jelentkezik. Legelőször a zománc kutikula kopik le, azután kezd a zománc is kopni. Amikor a fogzománc lekopik az élekről, az alatta található dentin ezáltal feltáródik, és közvetlenül érintkezik a szájüregben lévő anyagokkal: nyállal, takarmánnyal. Erre a fog két módon reagál. Az egyik reakció során a primer dentinbe fokozott ásványi anyag beépülés (*mineralizáció*) következik be, melynek következtében növekszik a feltáródott dentin szilárdsága. A másik reakció, a dentinképző (*odontoblast*) sejtek pót- (*secundaer*) dentin képzésbe kezdenek, amivel elsősorban a kopott rész alatt vastagítják meg jelentősen a dentinállományt. A *secundaer* dentin előidézi a fogbélüreg (*cavum dentis*) folyamatos beszűkülését is radiális irányú képződése során. A pótdentin képződés élettani szerepe az, hogy a hamar lekopó zománc és primer dentin alatt a fogbélüreg ne táródjon fel, és így a fog fertőzése és gyulladása ne következzen be. A pótdentin képződése során zónákat hoz létre, amelyek száma utalhat az életkorra.

A pótdentin képződést a metszőfogaknál EIDMANN (1932) vizsgálta először gímszarvas esetében. Az I<sub>1</sub>-es fogak koronájában képződő pótdentin sávok alapján végzett korbecslést alkalmazható eljárásnak találta. A metszőfogkoronában elsőként képződő pótdentin zóna EIDMANN (1932) szerint 10-12 éves, NÁHLIK (1996) szerint már akár 5-6 éves korban le is kophat, ezért ez a módszer e kor után csak hozzávetőleges korbecslésre alkalmas. Mivel a zápfogkoronák viszonylag gyorsabban kopnak, ezért a zápfogkoronában képződő pótdentin vizsgálata még kevésbé informatív, mint a metszőfogkoronában képződötté. Mindezek miatt az őz esetében sem várható, hogy a fogkoronai rész csiszolatainak vizsgálata a gímszarvasénál kedvezőbb eredményeket hoz, de a foggyökerek horizontális metszeteinek vizsgálata – mivel ezen a helyen a fogkopás nem jelentkezik – elképzelhetően értékelhető eredményt nyújt.

KLEVEZAL és KLEINENBERG (1967) vizsgálata szerint az őz dekalcinált I<sub>1</sub>-es fogainak horizontális metszetében megfigyelhető secundaer dentin sávok száma megegyezik az egyedek életkorával.

## **2.4. Egyéb korbecslési módszerek, és korra utaló bélyegek**

### **2.4.1. A koponyacsontok vastagsága és a varratok elcsontosodásának mértéke**

A koponyacsontok (*ossa cranii*) vastagsága és a koponyavarratok (*sutura cranii*) elcsontosodása, ezeken belül elsősorban a homlokcsont (*os frontale*) vastagsága és a homlokvarrat (*sutura frontalis*) elcsontosodása alapján a korcsoportok különíthetők el.

- A fiatal bak homlokcsontja vékony, enyhén áttetsző, a homlokvarrat jól látszik, kiemelkedik a homlokcsont síkjából.
- A középkorú bak homlokcsontja vastagabb, a varrat belesimul a homlokcsont síkjába;

- Az öreg bak homlokcsontja vastag, a varratok alig láthatóak (SZIDNAI, 1978).

#### **2.4.2. Az agancstő átmérője és szögállása**

Az agancstő, más néven agancs csap, átmérője az életkorral nő a magassága csökken. Az agancstő fiatal korban medialisan hajlik, középkorú őzbaknál függőlegesen, időskorban laterálisan dől. Az agancstő átmérője és a kor közötti kapcsolatot STUBBE és LOCKOW (cit.: VARGA, 1996) vizsgálták. Vizsgálatukban viszonylag magas korrelációs koefficienszt számítottak ( $r=0,691$ ). Ha ez alapján kiszámítjuk a determinációs koefficiens értékét ( $r^2=0,477$ ) megkapjuk, hogy az életkor a vizsgált mintában 47,7 %-ban befolyásolja az agancstő átmérőjét. SZEDERJEI (1955) szerint az agancstő átmérőjének mérésén alapuló módszer nem használható korbecslésre, mert előfordulhat, hogy egy jó tulajdonságú egyéves baknak az agancstöve vastagabb, mint egy négy-öt éves gyenge képességűé.

STUBBE és LOCKOW (cit.: VARGA, 1996) az  $M_1$ -es fog magassága és az agancstő átmérője, illetve az összes zápfog magassága és az agancstő átmérője segítségével korbecslő nomogramot szerkesztettek. A nomogram pontossága vizsgálatuk szerint 50 %-ban évre pontos, 33,8 %-ban 1 év eltérés, 11,2 %-ban 2 év eltérés, 5 %-ban 3 év eltérés volt. E módszerrel az 1 éves kor nem becsülhető a felülbecslés miatt és a 26 mm-nél nagyobb csapátmérőjű bakok esetében is a valóságnál magasabb kort mutat. Ez az eljárás ugyan objektív méréseken alapul, pontossága mégsem haladja meg a fogkopás alapján becsült kort.

#### **2.4.3. A szívcsont hossza**

Az aorta nyílása és a bal kamra között helyezkedik el őznél egy kis méretű elcsontosodó képlet, a szívcsont (*os cordis*). A szívcsont hossza az őz esetében az életkorral egy ideig növekszik, majd csökkenni kezd. A szakirodalomban két szerző számolt be a szívcsont hosszúsága és az életkor kapcsolatának vizsgálatáról. A közölt életkorhoz tartozó adataik közötti különbség e módszer megbízhatatlanságá-

ra utal (KŐHALMY, 1999). Az alábbi 4. számú táblázatban bemutatom MÜLLER (1976, cit.: KŐHALMY, 1999) szívcsonthosszakra vonatkozó összefoglaló adatait.

4. táblázat

Az életkor és a szívcsonthosszának kapcsolata  
MÜLLER (1976, cit.: KŐHALMY, 1999) nyomán

Életkor (év)	Szívcsonthossza (mm)
0,5	9
1-2	12
3-4	13
5-6	15
7-8	19
9-10	21
11-12	19
≥13	18

#### 2.4.4. A szemlencse szárazanyag tartalma

A szemlencse tömege az emlősök élete során folyamatosan növekszik (MORRIS, 1972). Ennek megfelelően szemlencse száraz tömegét az életkorral kapcsolatba hozták több vadfajnál, például gímszarvasnál és őznél MARINGGELE (1979), mezei nyúlnál BROEKHUIZEN (1971), PÉPIN (1973, 1974), KOVÁCS (1983), PASCAL és KOVÁCS (1983), KOVÁCS és HELTAY (1993), fácánnál NAGY és PUSKÁS (1977).

MARINGGELE (1979) 35 őz becsült életkora és a szemlencsájuk száraz tömegének kapcsolatát vizsgálata. Az alábbi, 5. számú táblázatban bemutatom összefoglaló adatait. Vizsgálatában megállapítja a szemlencse száraz tömegének növekedését, de adatai statisztikai értékelését nem végezte el.

## 5. táblázat

Az őz életkora és a szemlencse száraz tömegének kapcsolata  
MARINGGELE (1979) nyomán

Életkor	Szemlencse száraz tömege (mg)
1 hónap	120
1 év	228
3 év	302
5-7 év	354
9-12 év	383

ANGIBAULT ET AL. (1993) 45 ismert korú őzet vizsgált meg. A szemlencse-tömegek és a kor kapcsolatát megvizsgálva rendkívül szoros regressziót mutattak ki. A bakok esetében a determinációs koefficiens  $r=0,939$ , a sutáknál  $r=0,936$ .

#### 2.4.5. A pajzsporc csontosodása

A pajzsporc (*cartilago thyroidea*) elcsontosodásán alapuló módszert SCHUMACHER (é.n. cit.: SZEDERJEI, 1955) dolgozta ki. Eszerint a korrallal nő a pajzsporcban kialakuló elcsontosodott rész, a porcállomány rovására. SZEDERJEI (1955, 1959) és MEÁK és SZEDERJEI (1957) arra a következtetésre jutottak, hogy amennyiben e módszert alkalmazni kívánjuk, úgy az életkor és a pajzsporc elcsontosodásának mértékét populációnként kell megállapítani. Becslésük szerint így akár 60 %-os pontosság is elérhető.

#### 2.4.6. A rágóizom árka

Az állkapocs ágának (*ramus mandibulae*) külső felületén (*facies lateralis*) található meg a külső rágóizom (*musculus masater*) tapadására szolgáló árok, a rágóizom árka (*fossa masaterica*) (FEHÉR, 1980). Egyes vélemények (KÖHALMY, 1999) szerint a rágóizom árka és az állkapcsi szöglet (*angulus mandibulae*) érdeksége, rajzolata, kiemelkedése alkalmas lehet korbecslésre.

Korábbi megfigyeléseim (MAROSÁN, 1999) a gímszarvasnál ezt nem támasztják alá. A szarvas esetében, az individuális adottságok dominálása elfedi a korra utaló viszonylagos változásokat.

### 2.4.7. A trófeabírálati korbecslés

A hivatásos trófeabírálaton a korbecslést a vadászati hatóság szakemberei az alábbi korra utaló bélyegek figyelembe vételével állapítják meg:

- Az agancs összképe (fejlődőképesség, kulmináció, visszarakás);
- A koszorú és az agancstő dőlése;
- A koponyacsontok vastagsága és a koponyavarratok elcsontosodása;
- Az orrsövényporc elcsontosodása;
- A fogkopás (amennyiben a fogsor rendelkezésre áll!).

KOVÁCS és FELEK (1991) 7 hivatásszerűen trófeabírálattal foglalkozó személyt kértek fel, hogy ismert korú őz trófeákon korbecslést végezzenek. A becslések adatai nem mutattak statisztikailag igazolható kapcsolatot a tényleges korrallal. Mindössze 14%-os volt az egyezés, és 86%-ban tértek el egymástól a becslések. A túlbecslések domináltak nagyobb mértékben, alul becslés alig fordult elő. A vizsgálat tapasztalatai szerint nyolcéves túlbecslés is előfordult. És mindössze 2 szakember becsülte a kort pontosan.

### 2.4.8. A Rajnik-módszer

Az orrsövény (*septum nasi*) caudalisan csontos (*septum nasi osseum*), rostralisan porcos (*cartilago septi nasi*) részből áll (FEHÉR, 1980).

RAJNIK (1977) életkorbecslési módszere azon a felismerésen alapul, hogy a korrallal a porcos rész fokozatosan csontosodik el. E módszer szerint, az elcsontosodott orrsövény hosszának az orrcsont (*os nasale*) hosszához viszonyított arányából következtethetünk a korra. A módszer fő hibája, hogy az orrsövény csontos része apicalisan zegzugos rajzolatot mutat, így csak szubjektív értékelésre van lehetőségünk (IFF, 1978, cit.: KŐHALMY, 1999).

### 3. Anyag és módszer

#### 3.1. A mintagyűjtési területek élőhelyi jellemzői

A mintaterületek élőhelyi jellemzőit MAROSI és SOMOGYI (1990) alapján állítottam össze.

##### **Békés megyei mintaterület**

A Békés megyei vizsgálatok során Békési-sík kistáj területéről gyűjtöttük a vizsgálati mintát. A kistáj földrajzi értelemben lösszel és agyaggal fedett hordalék-kúp síkság. Éghajlata meleg, illetve mérsékelt meleg és száraz. Az évi napfénytartam összege 2000 óra, a középhőmérséklet 10,2-10,4 °C, a vegetációs időszak átlaghőmérséklete 17,1-17,3 °C, a fagymentes napok száma 194 körül ingadozik. A csapadékösszeg 550-570 mm között változik, a vegetációs időszak csapadékösszege 320-330 mm közötti. Az évi hóborítottság időtartama jellemzően 31-34 nap. A kistáj legjellemzőbb talajtípusa a löszön képződött alföldi mészlepedékes csernozjom, kisebb arányban található a területen réti csernozjom és szikesek talajok (réti szolonyec, sztyepesedő réti szolonyec és szolonyeces réti talaj). A talajok mechanikai összetétele vályog és agyagos-vályog. A természetes növénytakarót elsősorban a tatárjuharos lösztölgyesek, a pusztai tölgyesek és a sziki tölgyesek jellemezték. Jelenleg az erdőművelés alá vont területeken főként fiatal- és középkorú, fenyőerdőket találunk. A terület 86,4%-a szántóföld, 2,0%-a erdő, 3,2%-a belterület, a rét-legelő aránya 7,3%, a kerté és a szőlőé 0,7%.

##### **Győr-Moson-Sopron megyei mintaterület**

A Győr-Moson-Sopron megyei mintagyűjtést a Lajta-Hanság Rt üzemi vadászterületein végeztem. A gyűjtéseket földrajzi értelemben a Mosoni-síkon és a Hanságban végeztem.



A Mosoni-sík magasártéri hordalékkúp síkság. Éghajlata mérsékelt hűvös és száraz. Az évi napfénytartam összege 1900 óra, a középhőmérséklet 9,5-10,0 °C, a vegetációs időszak átlaghőmérséklete 16,0-16,5 °C, a fagymentes napok száma 182-185 között ingadozik. A csapadékösszeg 580-600 mm között változik, a vegetációs időszak csapadékösszege 330-340 mm közötti. Az évi hóborítottság időtartama jellemzően 35-45 nap. A kistáj legjellemzőbb talajtípusa a löszös üledéken képződött csernozjom, kisebb arányban található a területen mészlepedékes csernozjom. E talajok vályog mechanikai összetételűek. A Mosoni-Duna és a Lajta közelében réti- és réti öntéstalajok találhatóak, mechanikai összetételük vályog és agyagos vályog. A természetes növénytakarót elsősorban a fűzligetek, a égerligetek, a keményfaligetek, a gyertyános-kocsányos tölgyesek, illetve a szárazabb területeken a gyöngyvirágos tölgyesek jellemezték. Az erdőművelés alá vont területeken fiatal- és középkorú, kemény- és lágy lombos fafajok a jellemzőek. A terület 85,3%-a szántóföld, 6,1%-a erdő, 6,0%-a belterület, a kert, a szőlő és a rét-legelő aránya 0,7%.

A Hanság földrajzi értelemben alacsonyártéri agyaggal, iszappal, tőzeggel fedett síkság. Éghajlata mérsékelt hűvös és mérsékelt száraz. Az évi napfénytartam összege 1900-1950 óra, a középhőmérséklet 10,0 °C, a vegetációs időszak átlaghőmérséklete 16,0 °C, a fagymentes napok száma 185 körül ingadozik. A csapadékösszeg 590-630 mm között változik, a vegetációs időszak csapadékösszege 350-360 mm közötti. Az évi hóborítottság időtartama jellemzően 40-42 nap. A kistájra réti- és a réti öntéstalajok jellemzőek. A talajok agyagos vályog mechanikai összetételűek. A természetes növénytakarót égeres láperdők, nyírláperdők, zombékosok mocsárrétek jellemezték. Az erdőgazdaságilag hasznosított területeken fiatal lágylombos fajok, elsősorban nemesnyárasok fordulnak elő. A terület 57,9%-a szántóföld, 14,4%-a erdő, 1,5%-a belterület, a rét-legelő 9,1%, a kert aránya 0,3%.

## Tolna megyei mintaterület

A Tolna megyei vizsgálatok során Közép-Mezőföld kistáj területéről gyűjtöttük a vizsgálati mintát. A kistáj földrajzi értelemben lösszel fedett hordalékkúp síkság. Éghajlata mérsékelt meleg és mérsékelt száraz. Az évi napfénytartam összege 2000-2050 óra, a középhőmérséklet 9,8-10,3 °C, a vegetációs időszak átlaghőmérséklete 16,1-17 °C, a fagymentes napok száma 186-207 között ingadozik. A csapadékösszeg 550-600 mm között változik, a vegetációs időszak csapadékösszege 320-340 mm közötti. Az évi hóborítottság időtartama jellemzően 30-32 nap. A kistáj legjellemzőbb talajtípusa a löszön képződött mészlepedékes csernozjom, jóval kisebb arányban található a területen réti csernozjom, barnaföld, csernozjom barna erdőtalaj, réti szolonyec, réti öntés és humuszos homoktalaj is. A talajok vályog mechanikai összetételűek. A természetes növénytakarót elsősorban a tatárjuharos löszpusztai tölgyesek, a cseres tölgyesek, a tölgy-kőris-szil ligeterdők és a fűz-nyár-égerligetek jellemezték. Jelenleg az erdőművelés alá vont területeken fiatal- és középkorú, kemény- és lágymombos fafajok a jellemzőek, a fenyők aránya jóval szerényebb. A terület 84,2%-a szántóföld, 5,6%-a erdő, 5,4%-a belterület, a kert, a szőlő és a rét-legelő aránya 4,1%.

### 3.2. A vizsgálati anyag

A vizsgálati anyagot, a begyűjtött őzállkapcsok, fejek illetve az úgynevezett kiskoponya lefűrészélése után megmaradt csonkolt koponyák alkotják, a hozzájuk tartozó legfontosabb adatokkal. A 636 egyedből származó mintánál a mandibula mellé a csonkolt koponyát is sikerült 68 esetben beszerezni. Az állkapcsokat és a koponyákat az ország több élőhelyéről (Tolna, Győr-Moson-Sopron és Békés megye) gyűjtöttem be hivatásos vadászok, illetve vadászati felügyelők segítségével 1998 és 2004 között. A 6. táblázatban bemutatom a gyűjtött anyag származási helyét az elejtés időpontját és a darabszámokat.

## 6. táblázat

A vizsgálati anyagok származási helyei, elejtési időpontjai és darabszámjai

Elejtés helye (megye)	Elejtési időpont (év)	Egyedszám (db)
Békés	1998-1999	56
Tolna	2000-2004	494
Győr-Moson-Sopron	2004	86
<b>Összesen</b>		<b>636</b>

A Tolna-megyei mintából 356 példány bak és 138 példány suta volt. Békés és Győr-Moson-Sopron megyei minták csak bakokat tartalmaztak.

### 3.3. A vizsgálat módszerei

Munkám során körülbelül 66.700. adatot vettem fel és értékeltem. A korbecslési módszereket és korra utaló bélyegeket, illetve a közöttük lévő kapcsolatokat matematikai-statisztikai (biometriai) módszerek segítségével vizsgáltam meg (DAPSON, 1980; F. NAGY, 1994; BARÁTH, 1996; VARGHA, 2000). Az alkalmazott módszerek a következők voltak:

- Regresszióanalízis;
- Korrelációanalízis;
- Determinációs koefficiens számítás;
- Fischer-féle F-próba;
- Egymintás t-próba;
- Egymintás z-próba.

Az alábbiakban röviden bemutatom a megvizsgált korbecslési módszereket és a korra utaló bélyegeket, amelyeket a vizsgálat során alkalmaztam. A bemutatás során nem térek ki a szakirodalmi áttekintésben már bemutatott módszerek részletezésére, e helyett a vizsgálatok gyakorlati kivitelezését és mérési módszereit ismertetem.

### 3.3.1. A fogkopás alapján végzett korbecslés

A fogkopás alapján végzett korbecslést AITKEN (1975), BLASE (1960), SZEDERJEI (1959) és SZIDNAI (1978) nyomán módosított, továbbá a trófeabírálatokon megfigyelt korbecslési gyakorlat alapján állítottam össze, a vizsgálatokat: 2.3.3. „A fogkopás morfológiája” című alfejezetben leírtak szerint végeztem.

### 3.3.2. A zápfogak külső magassága

A zápfogkoronák magasságát a fogkorona külső csipkéjétől és a korona külső felületének zománccal borított rész aljáig mértem, szemben több szerző (AITKEN, 1975; ASHBY ÉS HENRY, 1979; és mások) módszerével, akik az íny vonaláig mérték a fogkorona magasságát. A méréseket tized mm pontossággal végeztem, digitális tolómérő segítségével. Ha a fogkorona nem nőtt ki teljesen az állkapocsból, úgy csak az alveolus pereméig mértem.

Az előzápfogaknál egy, az utózápfogaknál kettő, az utolsó utózápfognál három fogkorona-magassági adat felvételére került sor. Az utózápfogaknál a két illetve három csúcs átlagmagasságát vettem alapul.

### 3.3.3. A metszőfogak hosszúsági paramétereinek vizsgálata

A metszőfogak esetében az alábbi adatokat vettem fel:

- A metszőfog korona ajaki felületének (*facies labialis*) hosszúságát, amelyet a fogkorona aljától, a metszőélig mértem;
- A metszőfog korona egész belső felületének (*facies linguinalis*) hosszúságát a nyelvi felületen lévő koronarész teljes hosszának mérésével állapítottam meg.
- A metszőfogak belső felületének kopottságát az érintett rész hosszúságának lemérésével oldottam meg;
- A fognyak hosszúságát, a fogmederperem szélétől a fogkorona aljáig mértem;

A fenti módszerekkel felvett adatok alapján kiszámoltam, az I<sub>1</sub>-es fogak fogkorona/fognyak hosszúságának az arányát, melyet a két mért adat hányadosa ad meg. A metszőfogakon lévő kopott rész és a belső felület hosszúságának az arányát szintén a mért adatpár hányadosa adja meg.

#### 3.3.4. A metszőfogak szögállása

Az I<sub>1</sub>-es fogak szögállásának vizsgálatát az alábbi síkgeometriai grafikus módszerrel végeztem el:

1. A fél állkapcsot a mediális oldalával egy papírlapra fektettem;
2. Felülről merőlegesen az állkapocsra nézve az *angulus mandibulae*-től apicalisan az *incisura vasorum facialium* alatt a papírlapra elhelyeztem egy pontot (A);
3. A *foramen mentale* és a *symphysis mandibulae* caudalis része között ventralisan jelöltem be a következő pontot (B);
4. A fogófoggal (I<sub>1</sub>) párhuzamba állítottam egy vonalzót és a fogófog tengelyének síkjában egy egyenes vonalat húztam;
5. Az állkapocs elvételét követően az A és B ponton áthaladó egyenest húztam;
6. A két egyenes által bezárt, a fogófog labialis oldalán lévő szög nagyságát szögmérővel megmértem;
7. Ha eltérés volt a két I<sub>1</sub>-es fog szögállása között, akkor azt átlagoltam, kivéve, ha az egyik helyeződése abnormális volt, olyankor csak a normális I<sub>1</sub> szögállását vettem figyelembe;
8. Az így kapott szög a metszőfog szögállását mutató szög.

#### 3.3.5. A fogsor hossza

A fogsor hosszát az első mandibuláris előzáfog (P<sub>1</sub>) elülső fogmedrének szélétől, az utolsó utózáfog (M<sub>3</sub>) hátulsó fogmedrének széléig mértem. A vizsgá-

latok során a jobb és a baloldali fogsorhosszokat egyaránt lemértem, s átlagolásával számítottam ki az egyedre jellemző fogsorhossz értékét.

### 3.3.6. A foghézag hossza


A foghézag hossza az állkapocs szegletfog (C vagy I<sub>4</sub>) medrének hátulsó peremétől az első előzáfog (P<sub>1</sub>) fogmedrének elülső végéig tart. A távolságát tolmérővel, tizedmilliméter pontossággal mértem, s a jobb és bal oldali fogsorhossz értékeit átlagoltam.

### 3.3.7. A szemlencsetömeg vizsgálata

A szemlencse vizsgálatát a következők szerint végeztem. Első lépésben szikével bemetszést készítettem a szaruhártyán, majd a hüvelyk-, vagy mutatóujjal az orbita felől nyomást gyakoroltam a szemhólyagra, aminek következtében a bemetszésen keresztül a szemlencse az üvegtesttel együtt kinyomódik a szemből. A szemlencséről ezt követően el kell távolítani az üvegtest maradványait. A szemlencse fixálására 10%-os neutralizált formaldehidet használtam. Amikor a szemlencsét boncteremben távolítottam el, a fixálást szövetmintagyűjtő kazettában végeztem. A szabadterületi gyűjtések során a szemlencsét egyedileg 50cm<sup>3</sup>-es gyógyszeres üvegekbe helyezem el, és a fixálás is azokban végeztem.




13. kép Szemlencse előkészítés 1.



14. kép Szemlencse előkészítés 2.

A fixálást követően a szemlencsét papírvattán szikkasztottuk, s majd tömegüket analitikai gyorsmérlegen lemértük. A feldolgozás során az így kapott tömegeket, *nedves tömeg*-ként neveztem meg. Ezután a szemlencsét 48 órán keresztül 60 °C-on szárítószekrényben szárítottuk, s majd



15. kép Szemlencse előkészítés 3.

tömegüket lemértük. Ez követően mintákat 105 °C-on szárítottuk tovább, 24 órán keresztül, s majd tömegüket ismételten lemértük. Az eljárást LORD (1959) eredeti módszere szerint végeztem azzal a különbséggel, hogy a tömegeket nedvesen, és 60 °C-os szárítást követően is lemértem, és a mért adatokat rögzítettem, s majd feldolgoztam.

### 3.3.8. A cementállomány vizsgálata

A cementállomány vizsgálatát MITCHELL (1963, 1967) és AITKEN (1975) leírása alapján, de néhány pontban módosítva végeztem el. Ennek során korábbi gímszarvasnál és őznel végzett vizsgálataim (MAROSÁN, 1999; 2000, 2001a, 2001b) tapasztalatait adaptáltam.


A csiszolatokat a következő technikával készítettem:

Az állkapocsban vagy az állcsontban lévő fogakat oly módon emeltem ki, hogy fúrógépbe fogott körfűrészlap segítségével, a laterális oldalon, a csonton bevágásokat végeztem. A kiemelendő fog előtt és mögött transzverzálisan kimartam a fogmedrek közötti széleket (*margo interalveolaria*), és közvetlenül a foggyökerektől laterálisan és azokkal párhuzamosan is készítettem bemetszést, továbbá a gyökércsúcsok alatt az állkapocs esetében, illetve a gyökércsúcsok felett az áll-

csont esetében horizontálisan végeztem bemetszést. Ezt követően a csontlemezeket egy kiélezett csavarhúzó segítségével lepattintottam és a fogakat a gyökér felől kitaltam az alveolusból. Az így kiszabadított fogakat hatvanas szemcsefinomságú csiszolótárcsával transzverzálisan a gyökérív közepéig, vagy majdnem a közepéig lecsiszoltam, majd a megmaradt foggyökér csúcsát is lecsiszoltam. A lecsiszolt felületeket 200-as, 600-as, 1000-es és végül 1200-as szemcsefinomságú vizes szilíciumkarbid csiszolópapíron políroztam, végül vászon polírozótárcsával tovább finomítottam a felületeket. A végső finomítás elvégzését kipróbáltam oly módon is, hogy a fogat a vizes csiszolópapírok után rajzlapon is körkörös mozdulatokkal dörzsöltem, így ugyanolyan jól vizsgálható preparátumokat kaptam, mint amelyeket korábban a vászon polírozótárcsa segítségével készítettem. A munkám során, amikor a preparátumokról nem készítettem fotót kipróbáltam, hogy lehetséges-e a végső finomító polírozás esetleges elhagyása. A tapasztalataim azt mutatták, hogy ha az eredeti csiszolópapír sorozatot 400-as, 800-as, 1400-as és végül 2000-esre cserélve alkalmazom, akkor a végső finomító polírozás teljes egészében elhagyható, és a preparátumok értékelhetősége ugyanolyan jó maradt.



16. kép. Az M1-es fog gyökérívének csiszolata 4 éves őzbaknál (20x)



17. kép. Az M1-es fog gyökérívének csiszolata 7 éves őzbaknál (40x)

A foggyökér horizontális csiszolatait úgy készítettem, hogy ne csak a cementet, hanem a dentint is föltárjam, mert csak így biztosított, hogy az összes cementzóna megfigyelhető. Arra is ügyelni kell, hogy a fenti szempontok teljesülése mellett a gyökércsúcsból minél kisebb rész kerüljön eltávolításra, mert a cementum



rétegződése a gyökércsúcshoz közelebb fokozottabb. Mind a transzverzális, mind a horizontális csiszolatokon a fehér zónák száma adja az őz korát években kifejezve (AITKEN, 1975).

A fűrészeléshez és a csiszolótárcsás műveletekhez egy 650 W névleges teljesítményű  $3000 \text{ min}^{-1}$  fordulatszámú, pótfogantyús (előtét-markolatos) fűrőgépet használtam. Az állkapcsokat, az állcsontokat és a fogakat olyan satuba rögzítettem, amelynek pofáját előzetesen gumival burkoltam. A munka során fültokot és pormaszkot használtam. A fogcsiszolatokat Zeiss SM-20, Zeiss SV-11 és Leica MZ-7<sub>5</sub> felső megvilágítású sztereó mikroszkópokkal vizsgáltam.

### 3.3.9. A pótdentin vizsgálata

A pót (*secundaer*) dentin vizsgálatához szükséges preparátum elkészítését az alábbiakban mutatom be.

A pótdentin vizsgálatához a fogófogat ( $I_1$ ) használtam fel. Mivel ez a fog viszonylag kis méretű és törékeny, ezért nem vettem ki a vizsgálat során a fogmederből, hanem az állkapocsban hagytam és az állkapocs pars incisiva-ját, a fogmedret – a benne lévő fogmeder-hártyával (*periodontium*), Sharpey-rostokkal – mint természetes ágyazati anyagot használtam. A metszőfogi részt a foghézagnál lefűrészelttem, majd satuba fogva a fogmedret a fogófoggal együtt a fogbélüreg (*cavum pulpa*) közepéig lecsiszoltam, és utána políroztam a cementállomány vizsgálatánál leírtak szerint. Nehézséget a preparátumkészítés során a fogak viszonylagos törékenysége és térgörbesége okozott.

### 3.3.10. Szövetteni preparátumok készítése

A cement- és dentin-állomány vizsgálatát nem csak csiszolatokon, hanem hisztotechnikai előkészítés után is vizsgáltam. A szövetteni vizsgálatokat az ELTE Állatszervezettani Tanszékén és a SZIE Anatómiai és Szövetteni Tanszékén végeztük. Az alkalmazott hisztotechnikai folyamatot az alábbiakban lépésenként, muta-

tom be elsősorban KISZELY ÉS BARKA (1958), ROMEIS (1968), CHAYEN ET AL (1973), KRUTSAY (1980, 1999), LESSON ET AL. (1985) VÍGH és KONDICS (1991), DELLMAN (1993), KÜHNEL (1997), RÖLICH (2002) és CSÁKI (2002) nyomán.

### **3.3.10.1. Dekalcinálás**

Első lépésben dekalcinálni kellett a fogakat. Ezt a műveletet 5%-os salétromsav oldatban végeztem. A dekalcinálás ideje a fog méretétől és kopottságától függően általában 1-4 nap volt. Nagyon lényegesnek bizonyult a dekalcinálás során, a fogak aktuális állapotának rendszeres – napi 4-5-szöri – ellenörzése. Tapasztalataim alapján a legjobb megoldás az, hogyha éjszakára kivesszük a fogakat a dekalcináló oldatból, és vízben tároljuk másnap reggelig, nehogy az a szükségesnél tovább legyen kiteve a sav hatásának. A fog akkor dekalcinálódik kellőképpen, amikor a koronáját kis átmérőjű tüvel át lehet szürni úgy, hogy sercegő hang nem kíséri ezt a folyamatot.

A dekalcinálás elvégezhető hangyasav és formaldehid keverékével is (FANCY, 1980), de a tapasztalataim alapján ez az eljárás minimum 2, de akár 3 hétig, sőt még tovább is eltarthat. Az EDTA (etilén-diamin tetra-acetát) általánosan használt kelát-komplex képző vegyület is alkalmazható dekalcinálásra, de még lassabb, mint a hangyasav-formaldehid elegy.

### **3.3.10.2. Kimosás, neutralizálás**

A kimosási, neutralizálási folyamatot legegyszerűbben 24 órán át tartó desztillált vizes fürdővel sikerült megoldani. Nem volt szükség a LOW és COWAN (1963) által javasolt lithium-karbonátos neutralizálásra.

### **3.3.10.3. Víztelenítés**

A víztelenítést egyre töményebb etanolban való fél-fél napos áztatással végeztük. Először 50%-os, majd 80%, 90%, 96%-os és végül kétszer abszolút etanolban történt a víztelenítés.

#### 3.3.10.4. Átderítés

A mintákat toluolban egy napig átderítettük.

#### 3.3.10.5. Átitatás

Az átitatást toluol paraplaszt keverékekben (2:1, 1:1, 1:2 arányban) végeztük 20-20 percig. Ezt követően 30 percig tiszta paraplasztot alkalmaztunk, s végül blokkokban 5-6 óráig folytattuk az átitatást, szintén tiszta paraplasztban. Az átitatási folyamat 60°C-os termosztátban történt. Az átitatást követően jeges vízfürdőben végeztük a paraplaszt dermesztését.

#### 3.3.10.6. Metszés

A metszést hagyományos szánya mikrotómmal végeztük. A metszetek vastagsága kb. 5 µm volt.


#### 3.3.10.7. Festés

A fentieknek megfelelő előkészítési folyamat után többféle festést is alkalmaztunk, melyeket az alábbiakban mutatok be.

#### Hematoxilin-eosin festés

A deparafinálást xilolban, és abszolút etanolban végeztük. Azt követően 70%-os alkoholban, majd desztillált vízben öblítettük a metszeteket. Az Erlich-féle hematoxilinban 15-60 másodpercet áztak a metszetek. Majd egy újabb öblítési folyamat után 0,1%-os eosin


oldatban végeztük a festést. Utána 96%-os, majd abszolút alkoholban öblítettük, majd 10 másodpercig xilolba tettük és végül lefedtük a metszeteket.



18. kép. M<sub>1</sub>-es fog gyökerének horizontális metszete, haematoxilin-eosin festés (100x)

### Heidenhain-féle azan festés


Az előzőekhez hasonló deparafinálási és öblítési folyamat után 5 percig azokármin oldatban végeztük a festést. Ezt követően mikroszkóp alatt végeztük a differenciálást, alkoholos anilin oldatban, majd 1% ecetsavat tartalmazó etanol oldatban fixáltuk a festéket. A pácolást 5%-os foszforwolfrámsavban végeztük 90 percig. Desztillált vizes öblítés után anilinkék-orange oldatban (módosított Mallory-oldatban) végeztük a festést. Ezt követte a víztelenítés, derítés és végül a lefedés.



19. kép. M<sub>1</sub>-es fog gyökerének cementuma, azan festés (240x)

### Goldner-féle trikróm-festés

A deparafinálást követően vashematoxilinnal végeztünk festés, majd 5 percig csapvízben öblítettük a metszeteket. Majd 5 percig festettük savanyú fuxin (0,1 g), ponceau de xilidine (0,2 g), ecetsav (0,6 ml) és desztillált víz (300 ml) keverékében. Ezt követően 0,2 %-os ecetsavban öblítettünk, s majd a festést orange G (2,0 g), foszforwolfrámsav (4 g) és



20. kép. M<sub>1</sub>-es fog gyökerének cementuma, Goldner-trikróm festés (240x)

desztillált víz (100 ml) keverékében folytattuk. Újabb öblítés után a festést fényzöld (0,2 g), ecetsav (0,2 ml) és desztillált víz (100 ml) keverékében fejeztük be. Ezután újabb öblítés következett 0,2%-os ecetsavban, majd etanolban. Ezt már csak víztelenítés, derítés és lefedés követte.

## Giemsa-festés

A deparafinálást követően 4 óráig kell a metszeteket festeni Giemsa-törzsoldat (3 ml), nátrium-acetát (0,05 g), ecetsav (0,1 ml) és desztillált víz (100 ml) keverékében.

## Ezüstimpregnáció vagy argentaaffin-reakció

Az ezüstözés (ezüstimpregnáció vagy argentaaffin-reakció) során az argentaaffin szöveti struktúrák az ammóniás ezüstnitrát-oldatot ezüstté redukálják. A metszeteket ammóniás ezüstnitrát-oldatban, 24 óráig, sötét helységben helyezük el. Ezután kétszer öblítjük desztillált vízben, majd 1 percig 5%-os nátriumtioszulfát-oldatban fixáljuk. Újabb öblítést követően




21. kép. M<sub>1</sub>-es fog gyökerének cementuma, ezüst impregnáció festés (120x)

Krenechtrottal végezzük a festést. Ezt követi egy újabb öblítés, majd víztelenítés, derítés és lefedés. Az eljárást követően az argentaaffin szövetrészek barnák vagy feketék lesznek.

### 3.3.10.8. Elektronmikroszkópos preparátumok készítése


A fogak cementállományát vizsgáltuk pásztázó elektronmikroszkóppal is. Ennek során – részben – felhasználtuk a már elkészített fogcsiszolat-preparátumokat, amelyeket úgy készítettünk elő, hogy a preparátumok vizsgálandó felületét vákuumgőzölőben 20 nm vastag szénréteggel vontuk be (GÁLNÉ, 1997). A



22. kép. M<sub>1</sub>-es fog gyökerének cementuma, transzmissziós EM

preparátumok oldalait széngyurmával borítottuk be, a vizsgálatához szükséges vezető képesség kialakítása érdekében. A vizsgálatainkat megismételtük úgy is, hogy a

gyökérívben lévő vastagabb cementállományt lerepesztettük a dentinről, s egy széthajtogatott gémkapocsra téve, a cementre két oldalról nyomást gyakorolva sagittális irányban eltörtük. A tört preparátumokat is az előzőekhez hasonlóan szénnel vontuk be. Az elektronmikroszkópos vizsgálatokat az ELTE Közöttani és Geokémiai Tanszékének RTG Mikroszonda Laborjában végeztük.



23. kép. M<sub>1</sub>-es fog gyökérívének cementuma. scanning EM

### **3.3.11. A trófeabírálati korbecslés**

Vizsgálataimnál a vadászati hatóság által megállapított hivatalos trófeabírálati kort összehasonlítottam a fogak cementzónái alapján becsült korról, és ez alapján értékeltem a trófeabírálati korbecslés pontosságát és megbízhatóságát.

### **3.3.12. A terepi korbecslés**

A terepen becsült kort a területen dolgozó hivatásos vadászok állapították meg az elejtés előtt. A becsülést az élő őz testfelépítése, testtáj arányai, agancsa és a viselkedése alapján, a 2.2. „Az élő őz terepi korbecslése” című alfejezetben leírtak szerint végezték.

### **3.3.13 Az orrsövény elcsontosodása**

Az orrsövény elcsontosodásának mértékéből RAJNIK (1977) módszere szerint becsültük a kort. A 2.4.8. „A Rajnik-módszer” című alfejezetben leírtak szerint.

## 4. Az eredmények ismertetése és értékelése

Az alábbiakban bemutatom a korbecslési módszerek és azt követően a korra utaló bélyegek vizsgálatának eredményét és értékelésüket.


### 4.1. A cementállomány vizsgálatának értékelése

#### 4.1.1. A fogcsiszolatokon megfigyelhető cementzónák vizsgálatának értékelése

A cementállomány értékelésének tapasztalatait az alábbiakban mutatom be:

- Az állkapocs  $M_1$ -es fogait vizsgálva az esetek 60 %-ban a gyökérívben képződött cementzónák alapján becsülhető volt a kor. Ha az  $M_1$  gyökérívének alapján nem volt a kor megbecsülhető a zónák képződésének értékelhetetlensége miatt, olyankor jellemzően az  $M_2$  és az  $M_3$  gyökérívnek cementállománya sem mutatott olyan rétegződést, amely alapján a kor becsülhető lett volna.
- Azokban az esetekben, amikor a cementállományban a zónák nem különültek el jól kivehető formában a mikroszkóp fényforrásának az erősségét, irányát, és a fényforrás kicserélésével a színhőmérsékletét megváltoztattam és ezt követően újra vizsgáltam a preparátumot. Ha ez sem hozott kellő eredményt a ráeső fényt, a vizsgálati tárgy felett 5-6 mm magasságban kitakartam egy vékony 2 vagy 3 mm szélességű fotókarton csík segítségével. Így sikerült azt elérni, hogy nem a tárgy felületéről visszaverődő fény által létrehozott képet lehetett vizsgálni, hanem a fogn keresztül haladó fény alkotta kép vált megfigyelhetővé. Mindezek segítségével az értékelést legtöbbször újabb preparátum készítése nélkül is el tudtam végezni.

- Az előzáfogak gyökérívében akkor is ritka volt a rétegződés, ha az M<sub>1</sub>-nél jól látható volt. Azokban az esetekben, amikor az utózáfogak gyökérívének alapján nem tudtam kort becsülni, a foggyökér alsó <sup>1</sup>/<sub>4</sub>-<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-ánál készített horizontális csiszolatot nagyon alaposan megvizsgálva a metsző, az előzáf- és az utózáfogaknál megfigyelt rétegződött cementállomány alapján becsültem meg a kort. Az esetek 6,5%-ában előfordult, hogy csak többszöri fogcsiszolat készítés után jutottam olyan preparátumhoz, amely alapján a korbecslés a lehetőségekhez képest egzaktul elvégezhető volt.
- Így minden esetben tudtam kort becsülni, szemben BRIEL (1979) 11 %-os eredményével.
- A maxilláris fogaknál a cementállományban rétegződés alig, vagy egyáltalán nem volt látható, úgy a gyökérív transzverzális, mint a foggyökér horizontális csiszolataiban. 68 őz maxilláris fogainak cementállomány vizsgálata során egyetlen esetben sem tudtam az életkorra következtetni.
- Vékony átvilágítható csiszolatok esetén nem találtam jól értékelhető zónákat, sem a mandibuláris, sem a maxilláris fogaknál, még polarizált fényben történő értékeléskor sem.



24. kép. M<sub>1</sub>-es fog gyökerének horizontális csiszolata polarizált fényben (100x)

Mindezek alapján igen jól használható módszernek minősíthető a magyarországi élőhelyi viszonyok között az alsófogsor fogainak cementzónái alapján végzett korbecslés. Valószínűsíthető, hogy az állkapocs fogainak cementréteg vizsgálata nagyobb minta elemszám esetén sem hoz érdemi eredményváltozást hazai körülmények között.




#### 4.1.2. A cementzónák hisztotechnikai vizsgálatának értékelése

A hisztotechnikai vizsgálatok során a különböző festési eljárásokat értékelve megállapítható, hogy a Goldner-féle trikróm, a Heidenhain-féle azan, és a Giemsa-féle festési eljárások bizonyultak a leginformatívabbnak. A haematoxin-eosin festés is értékelhető eredményt ad, de az előbbi három eljárás sokkal könnyebben értékelhető, és jobban differenciált eredményt ad. Az ezüst imegnációs eljárás nem nyújtott értékelhető eredményt. Mindezek alapján javasolható, a Giemsa-féle festés alkalmazása a korbceklési célú szövettani vizsgálatokban a cementállomány értékelésére. E módszer egyetlen hátránya, hogy rendkívül gyorsan fakulnak a metszetek. Ami azt jelenti, hogy azok elkészülte után néhány órával, vagy lehetőleg kevesebb, mint egy nappal az értékelésüket elkészítsük, mert a Giemsa-szerint festett metszetek az elkészültük után azonnal elkezdnek fakulni, és néhány nap után a metszetek pontosan már nem értékelhetőek. Egy-két hét elteltével gyakorlatilag teljesen elvesztik színüket.

Az elektronmikroszkópos vizsgálatokat értékelve megállapíthatjuk, hogy sem a tört felületekről készített szkennig, sem a polírozott felületekről készített visszavert elektronkép, sem a transzmissziós eljárás nem hozott értékelhető eredményeket. A cementum zónái egyik módszer esetében sem tűntek elő.


#### 4.2. A pótdentin-vizsgálatok értékelése

Az I<sub>1</sub>-es fogak sagittális csiszolatával nyert 105 preparátumból mindössze hatnál találtam enyhén látható sávokat, amelyek száma az életkorral kapcsolatot nem mutatott. Így ezt a módszert nem tartom alkalmasnak az őz korbceklésére.



25. kép. M<sub>1</sub>-es fog gyökerének secundaer dentinje, azan festés (240x)

Ezzel szemben a hisztotechnikai eljárással készült, festett szövettani metszetek ugyanolyan jól értékelhetők, mint a cementum metszetei. A pótdentin szakaszos növekedésének eredményeként a pulpa üregét szűkítő zónák jól elkülöníthetők egymástól. Érékelhetőségük idős egyedeknél is kiváló. A tapasztalataim azt mutatják, hogy a cementum vizsgálatánál is jól használható Goldner-féle trikróm, a Heidenhain-féle azan, és a Giemsa-féle festési eljárások a leginformatívabbak. A haematoxin-eosin festés is értékelhető eredményt ad, akár csak a cementum esetében, de az előbbi három hisztotechnikai eljárás sokkal könnyebben értékelhető, és jobban differenciált eredményt ad.




26. kép. M<sub>1</sub>-es fog gyökerének secundaer dentinje, Goldner-trikróm festés (240x)

#### ***4.3. A cementzónák alapján becsült kor és a fogkopás alapján becsült kor összehasonlítása***

A cementzónák és a fogkopás alapján becsült kort Tolna, Győr-Moson-Sopron és Békés megyei bakoknál, illetve Tolna megyei sutáknál vizsgáltam meg összesen 635 adatpár segítségével.

A tolnai bakoknál 356 adatpár segítségével végeztem a vizsgálatokat. A becsült kor 87,64 %-ban egyezett meg, 11,24 %-ban egy év, 1,12 %-ban két év eltérés volt közöttük. Az adatpárokat regresszió és korreláció analízissel is vizsgáltam. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,9791$ ) igen magas, jóval meghaladja a kutatásban elfogadott 95 %-os megbízhatósági szint ( $P=0,05$ ;  $DF=355$ ) kritikus korrelációs koefficiens értékét ( $r^*=0,1779$ ). Így megállapítható, hogy az adatok között szoros, statisztikailag igazolható kapcsolat van. A determinációs koefficiens ( $r^2=0,9587$ ) értékének százszorosa megmutatja, hogy a cementzónák alapján be-

csült kor 95,87 %-ban befolyásolja a fogkopás mértékét a vizsgált mintában. A két módszer regresszióját az 1. ábra mutatja be.



1. ábra. A cementzónák és a fogkopás alapján becsült kor regressziója tolnai őzbakoknál (n=356)

A szórásnégyzeteket (varianciákat) F-próbával hasonlítottam össze. A számított F-érték ( $F=0,9720$ ) meghaladja a táblázati kritikus értéket ( $F^*=0,8396$ ), így a varianciák között különbség mutatható ki. Az adatokat összehasonlítottam egymintás z-próbával is. A számított z érték ( $z=-0,3110$ ) abszolút értéke jóval alatta marad 95 %-os megbízhatóság mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=355$ ) a kritikus z-értéknek ( $z^*=1,9600$ ), tehát a középértékek között, nincs statisztikailag kimutatható különbség. A két módszerrel becsült kor átlagának különbsége 0,045 év. Azaz a fogkopás alapján becsült kor átlagban alig mutatott többet, mint a cementzónák alapján becsült kor.

A lajtai bakoknál 86 adatpár segítségével végeztem a vizsgálatokat. A becsült kor 81,39 %-ban egyezett meg, 16,28 %-ban egy év, 2,33 %-ban két év eltérés volt közöttük. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,9691$ ) szintén igen magas, jóval meghaladja a mezőgazdasági kutatásban elfogadott 95 %-os

megbízhatósági szint ( $P=0,05$ ;  $DF=85$ ) kritikus korrelációs koefficiens értékét ( $r^*=0,2172$ ). Így megállapítható, hogy az adatok között szoros, statisztikailag igazolható kapcsolat van. A determinációs koefficiens ( $r^2=0,9391$ ) értékének százszorososa megmutatja, hogy a cementzónák alapján becsült kor 93,91 %-ban befolyásolja a fogkopás mértékét a vizsgált mintában. A szórásnégyzeteket (varianciákat) F-próbával hasonlítottam össze. A számított F-érték ( $F=0,9651$ ) meghaladja a táblázati kritikus értéket ( $F^*=0,6884$ ), így a varianciák között különbség mutatható ki. A számított z érték ( $z=-0,0748$ ) abszolút értéke jóval alatta marad 95 %-os megbízhatóság mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=85$ ) a kritikus z-értéknek ( $z^*=1,9600$ ), tehát a középértékek között nincs statisztikailag kimutatható különbség. A két módszerrel becsült kor átlagának különbsége 0,045 év. Azaz a fogkopás alapján becsült kor gyakorlatilag nem mutatott többet, mint a cementzónák alapján becsült kor.

A Békés-megyei bakoknál 56 adatkör segítségével végeztem a vizsgálatokat. A becsült kor 75,00 %-ban egyezett meg, 23,10 %-ban egy év, 1,79 %-ban két év eltérés volt közöttük. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,9732$ ) szintén igen magas, jóval meghaladja a mezőgazdasági kutatásban elfogadott 95 %-os megbízhatósági szint ( $P=0,05$ ;  $DF=55$ ) kritikus korrelációs koefficiens értékét ( $r^*=0,2732$ ). Így megállapítható, hogy az adatok között szoros, statisztikailag igazolható kapcsolat van. A determinációs koefficiens ( $r^2=0,9471$ ) értékének százszorososa megmutatja, hogy a cementzónák alapján becsült kor 94,71 %-ban befolyásolja a fogkopás mértékét a vizsgált mintában. A varianciákat F-próbával hasonlítottam össze. A számított F-érték ( $F=0,9651$ ) meghaladja a táblázati kritikus értéket ( $F^*=0,6884$ ), így a varianciák között különbség mutatható ki. A számított z érték ( $z=-0,1215$ ) abszolút értéke jóval alatta marad 95 %-os megbízhatóság mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=55$ ) a kritikus z-értéknek ( $z^*=1,9600$ ), tehát a középértékek között nincs statisztikailag kimutatható különbség. A két módszerrel becsült kor átlagának különbsége 0,054 év. Azaz a fogkopás alapján becsült kor gyakorlatilag nem mutatott többet, mint a cementzónák alapján becsült kor.

A Tolna-megyei őzsutáknál 138 adatpár segítségével végeztem a vizsgálatokat. A becsült kor 78,10 %-ban egyezett meg, 18,98 %-ban egy év, 2,92 %-ban két év eltérés volt közöttük. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,9744$ ) szintén igen magas, jóval meghaladja a mezőgazdasági kutatásban elfogadott 95 %-os megbízhatósági szint ( $P=0,05$ ;  $DF=136$ ) kritikus korrelációs koefficiens értékét ( $r^*=0,1779$ ). Így megállapítható, hogy az adatok között szoros, statisztikailag igazolható kapcsolat van. A determinációs koefficiens ( $r^2=0,9494$ ) értékének százszorosra megmutatja, hogy a cementzónák alapján becsült kor 94,94 %-ban befolyásolja a fogkopás mértékét a vizsgált mintában. A számított F-érték ( $F=1,0960$ ) nem éri el a kritikus értéket ( $F^*=1,326$ ), így a varianciák között különbség nem mutatható ki. A számított z érték ( $z=0,3337$ ) abszolút értéke jóval alatta marad 95 %-os megbízhatóság mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=355$ ) a kritikus z-értéknek ( $z^*=1,9600$ ), tehát a középértékek között nincs statisztikailag kimutatható különbség. A két módszerrel becsült kor átlagának különbsége 0,1 év. Azaz a cementzónák alapján becsült kor statisztikailag nem mutatott többet, mint a fogkopás alapján becsült kor.

A fentiek alapján elmondható, hogy a cementzónák alapján és a fogkopás módszerével becsült kor 95 %-os megbízhatóság mellett azonosnak nem tekinthetőek, de egymáshoz kiemelkedően jól közelítenek. Ezek szerint a precízen végzett fogkopás alapján történő korbecslés a legjobb gyakorlati módszer.


#### ***4.4. A cementzónák száma alapján becsült kor és a trófeabírálati kor összehasonlítása***

A cementzónák és a trófeabírálaton becsült kort Tolna- és Békés-megyei bakoknál vizsgáltam meg összesen 399 adatpár segítségével.

A tolnai bakok esetében 343 adatpár felhasználásával értékeltem a cementzónák száma alapján becsült és a trófeabírálati kort. Az adatok 35,96 %-ban egyeztek, 39,61 %-ban egy év eltérés, 15,45 %-ban két év eltérés, 6,73 %-ban há-

rom év eltérés, 1,69 %-ban négy év eltérés, 0,28 %-ban (egy esetben) hat év eltérést és 0,28 %-ban (egy esetben) nyolc év eltérést mutattak. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,6380$ ) eléri a mezőgazdasági kutatásban elfogadott 95 %-os megbízhatósági szint mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=342$ ) a kritikus korrelációs koefficiens értékét ( $r^*=0,1779$ ). Ezek alapján a vizsgált minta statisztikailag igazolható kapcsolatot mutat. A determinációs koefficiens értéke ( $r^2=0,4070$ ) szerint a cementrétegek alapján becsült kor 40,70 %-ban határozza meg a trófeabírálati kort. A két módszer regresszióját a 2. ábra mutatja be.

A szórásnégyzeteket (varianciákat) F-próbával hasonlítottam össze. A szá-



2. ábra A cementzónák alapján becsült kor és a trófeabírálati kor regressziója tolnai bakoknál (n=343)

mított F-érték ( $F=1,5987$ ) nem haladja meg a táblázati kritikus értéket ( $F^*=1,932$ ), így a varianciák között különbség nem mutatható ki. Az adatokat összehasonlítottam egymintás z-próbával is. A számított z érték ( $z=-1,5398$ ) abszolút értéke alatta marad 95 %-os megbízhatóság mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=342$ ) a kritikus z-értéknek ( $z^*=1,9600$ ), tehát a középértékek között nincs statisztikailag kimutatható különbség. A két módszerrel végzett korbecslési eljárás átlaga 0,2 év eltérést mutatott a

trófeabírálati kor javára. Ez az érték a z-próba eredménye szerint statisztikailag jelentéktelennek tekintendő.

A békési bakok esetében 56 adatpár felhasználásával végeztem vizsgálataimat. Az adatok 39,28 %-ban megegyeztek, 14,28 %-ban egy év eltérés, 8,93 %-ban két év eltérés, 19,64 %-ban három év eltérés, 14,28 %-ban négy év eltérés, 1,79 %-ban (egy esetben) öt év eltérést és 1,79 %-ban (egy esetben) hat év eltérést mutattak. A két módszerrel végzett korbecslési eljárás átlaga 0,71 év eltérést mutatott a trófeabírálati kor javára. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,4882$ ) eléri a mezőgazdasági kutatásban elfogadott 95 %-os megbízhatósági szint mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=55$ ) a kritikus korrelációs koefficiens értékét ( $r^*=0,2383$ ). Ezek alapján a vizsgált minta gyenge statisztikailag igazolható kapcsolatot mutat. A számított F-érték ( $F=0,9920$ ) meghaladja a táblázati kritikus értéket ( $F^*=0,6393$ ), így a varianciák között különbség mutatható ki. A számított z-érték ( $z=-1,6613$ ) abszolút értéke alatta marad 95 %-os megbízhatóság mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=55$ ) a kritikus z-értéknek ( $z^*=1,9600$ ), tehát a középértékek között, nincs statisztikailag kimutatható különbség.

Az adatsorok között nem túl markáns különbség mutatkozott meg, s ennek oka a vadászati felügyelők felkészültségének és tapasztalatának különbségeiből adódott.

Mivel alig több, mint az esetek egyharmadában egyezett meg a két módszerrel becsült életkor, a kapcsolatot a nem túl magas korrelációs és determinációs koefficiensek miatt a gyakorlat szempontjából gyengének minősíthetjük. A trófeabírálati korbecslés pontatlanságának okai:

1. A trófeabírálaton a kort legtöbbször az agancs jellege, a koszorúk és az agancstő dőlése, a koponyacsont vastagsága és a koponyavarratok elcsontosodása alapján becsülik. Ezek a módszerek gyenge, legfeljebb kö-

zepes erősségű kapcsolatba hozhatók a korral. Pontatlan bélyegekből nem lehet pontos kort becsülni.

2. A trófeabírálati szankciók, azaz mínusz pontok elkerülésének lehetősége (erre a túlbecsült korok utalnak).
3. Sokszor felületes a trófeabírálatkor a kor megállapítása (erre az alul- és a túlbecslés is utal).
4. A kiskoponyás trófeabírálatkor sokszor nem követelik meg a levágott koponyarész bemutatását, vagy azt nem veszik figyelembe. Így a fogkopás mértékének alapulvétele nem tudja pontosítani a becsült trófeabírálati kort.


#### ***4.5. A cementzónák száma alapján becsült kor és a terepen becsült kor eredményeinek összehasonlítása***

A cementzónák száma alapján becsült kor és a terepi korbecslés eredményeinek összehasonlítását Tolna- és Békés-megyei bakoknál összesen 333 adatpár segítségével végeztem el.

A tolnai bakok esetében 277 adatpár segítségével végeztem vizsgálataimat. Az adatok 37,91 %-ban megegyeztek, 32,13 %-ban egy év eltérés, 20,94 %-ban két év eltérés, 11,19 %-ban három év eltérés, 2,17 %-ban négy év eltérés és 1,08 %-ban (három esetben) hat év eltérést mutattak. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,5911$ ) eléri a mezőgazdasági kutatásban elfogadott 95 %-os megbízhatósági szint mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=276$ ) a kritikus korrelációs koefficiens értékét ( $r^*=0,1779$ ). Ezek alapján a fogcsiszolatokkal végzett korbecslési eljárás és a terepen becsült kor között statisztikailag igazolható kapcsolatot van. A determinációs koefficiens értéke ( $r^2=0,3494$ ) szerint a cementrétegek alapján becsült kor 34,94 %-



ban határozza meg a terepen becsült kort. A két módszer regresszióját a Tolna-megyei őzbakoknál a 3. ábra mutatja be.




3. ábra A cementzónák alapján becsült kor és a terepen becsült kor regressziója tolnai bakoknál (n=277)

A számított F-érték ( $F=1,7083$ ) meghaladja a táblázati kritikus értéket ( $F^*=1,2194$ ), így a varianciák között különbség mutatható ki. Az adatokat összehasonlítottam egymintás z-próbával is. A számított z érték ( $z=-2,4486$ ) abszolút értéke meghaladja 95 %-os megbízhatóság mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=276$ ) a kritikus z-értéket ( $z^*=1,9600$ ), tehát a középértékek között statisztikailag kimutatható különbség van. A két módszerrel becsült kor átlagának különbsége 0,348 év.

A békési bakok esetében 56 adatpár felhasználásával értékeltem a fogcsiszolatok és a terepi korbecslés kapcsolatát. Az adatok 53,57 %-ban megegyeztek, 37,5 %-ban egy év eltérés és 8,93 %-ban két év eltérés volt kimutatható. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,9062$ ) eléri a mezőgazdasági kutatásban elfogadott 95 %-os megbízhatósági szint mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=55$ ) a kritikus korrelációs koefficiens értékét ( $r^*=0,2383$ ). Ezek alapján a vizsgált minta statisztikailag igazolható szoros kapcsolatot mutat. A determinációs koefficiens értéke ( $r^2=0,8212$ ) szerint a cementrétegek alapján becsült kor 82,12 %-ban határozza meg a terepen becsült kort. A számított F-érték ( $F=1,0425$ ) nem éri el a táblázati kritikus értéket ( $F^*=1,5643$ ), így a varianciák között különbség nem mutatható ki. A számított z-érték ( $z=-1,4205$ ) abszolút értéke alatta marad 95 %-os megbízhatóság mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=55$ ) a kritikus z-értéknek ( $z^*=1,9600$ ). Tehát a középértékek közötti 0,179 év eltérés statisztikailag elhanyagolhatónak tekintendő. A két módszer regresszióját a Békés-megyei bakok esetében 4. ábra mutatja be.

A két mintaterületen tapasztalt eltérés okaként a terepen dolgozó hivatásos vadászok felkészültségében rejlő különbségeket lehet felhozni, ugyanis a tolnai mintaterületen dolgozó hivatásos vadászok középfokú szakképesítéssel rendelkeztek, míg a békési területen egy a munkájára nagyon igényes és jól felkészült vadgazda mérnök végezte a terepi korbecsléseket.




4. ábra A cementzónák alapján becsült kor és a terepen becsült kor regressziója békési bakoknál (n=56)

#### 4.6. A terepen becsült kor és a trófeabírálati kor összehasonlítása

A terepen becsült kor és a trófeabírálati kor összehasonlítását 305 őzbak adatként a segítségével végeztem el.

A tolnai mintából összesen 249 egyed esetében rendelkeztem mind a két adattal. Az adatok 45,38 %-ban megegyeztek, 36,95 %-ban egy év eltérés, 10,44 %-ban két év eltérés, 4,02 %-ban három év eltérés, 1,21 %-ban négy év eltérés, 1,61 %-ban (négy esetben) öt év eltérést és 0,40 %-ban (egy esetben) hét év eltérést mutattak. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,5552$ ) meghaladja ( $P=0,05$ ;  $DF=248$ ) a kritikus korrelációs koefficiens értékét ( $r^*=0,1779$ ). Ezek alapján a terepen becsült kor és a trófeabírálati kor között statisztikailag igazolható kapcsolatot van. A determinációs koefficiens értéke ( $r^2=0,3082$ ) szerint a terepen becsült kor 30,82 %-ban határozza meg a trófeabírálati kort. A két módszer regresszióját az 5. ábra mutatja be.





5. ábra. A terepen becsült kor és a trófeabírálati kor regressziója tolnai bakoknál (n=249)

A békési bakok esetében 56 adatpár segítségével végeztem az elemzéseket. Az adatok 30,35 %-ban megegyeztek, 30,35 %-ban egy év eltérés, 17,86 %-ban két év eltérés, 12,50 %-ban három év eltérés, 7,14 %-ban négy év eltérés és 1,79 %-ban (egy esetben) hat év eltérés volt kimutatható. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,4875$ ) eléri a mezőgazdasági kutatásban elfogadott 95 %-os megbízhatósági szint mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=55$ ) a kritikus korrelációs koefficiens értékét ( $r^*=0,2383$ ). Ezek alapján a vizsgált változó között statisztikailag igazolható kapcsolatot van. A determinációs koefficiens értéke ( $r^2=0,2377$ ) szerint a terepen becsült kor 23,77 %-ban határozza meg a trófeabírálati kort. A számított F-érték ( $F=0,9515$ ) meghaladja a kritikus táblázati értéket ( $F^*=0,6393$ ), így a varianciák között különbség mutatható ki. A számított z érték ( $z=-1,2632$ ) abszolút értéke alatta marad 95 %-os megbízhatóság mellett ( $P=0,05$ ;  $DF=55$ ) a kritikus z-értéknek ( $z^*=1,9600$ ). Tehát a középértékek közötti 0,535 év eltérés statisztikailag nem tekinthető jelentősnek.

#### 4.7. A cementzónák alapján becsült kor és a Rajnik-módszer alapján becsült kor összehasonlítása

A cementrétegek alapján becsült kor és az orrsövény elcsontosodásának kapcsolatát 138 őzsuta esetében volt lehetőségem vizsgálni. A cementzónák és az orrsövény alapján RAJNIK (1977) szerint becsült kor között szoros statisztikailag igazolható kapcsolatot sikerült kimutatni. A korrelációs koefficiens értéke igen magas ( $r=0,8841$ ). Az adatsorok varianciáját F-próbával hasonlítottam össze. Mivel a számított F-érték 1,1097 volt, és ez nem érte el a kritikus értéket ( $F^*=1,3258$ ), megállapíthatjuk, hogy a varianciák statisztikailag nem különböznek. Középértékek összehasonlítása során számított z-érték  $z=0,9685$  volt, ami nem haladja meg a kritikus z-értéket ( $z^*=1,9600$ ), így a középértékek is azonosnak tekinthetők. Mindezek alapján megállapítható, hogy a suták esetében az orrsövény vizsgálata az életkorról jól tájékoztat. A cementzónák száma és az orrsövény elcsontosodása alapján becsült kor regresszióját a 6. ábra mutatja be.





6. ábra. A cementzónák és az orrsővény alapján becsült kor regressziója tolnai őzsutáknál (n=138)

#### 4.8. *A cementzónák száma alapján becsült kor és a mandibuláris zápfogkoronák külső magasságának összehasonlítása*


Mivel a cementzónák száma alapján végzett korbecslés a legpontosabb korbecslési eljárás, ezért ehhez a módszerhez hasonlítottam a korra utaló bélyegeket. A cementzónák száma alapján becsült kor és a mandibuláris zápfogkoronák külső magasságának összehasonlítását 495 őzbak és 138 őzsuta esetében vizsgáltam meg. A cementzónák alapján becsült kor és a hozzá tartozó zápfogkoronák magasságainak összesített adatait a 7-10. számú táblázatban mutatom be.










*10. táblázat*

A cementzónák alapján becsült kor és a hozzátartozó zápfogkoronák magasságainak összesített adatai békési őzbakoknál  
(n=56)


Cement z. kor (év)	P <sub>1</sub> (mm)	P <sub>2</sub> (mm)	P <sub>3</sub> (mm)	M <sub>1</sub> (mm)	M <sub>2</sub> (mm)	M <sub>3</sub> (mm)	Átlag P <sub>1</sub> -M <sub>3</sub> (mm)
1 (n=7)	4,96	8,18	9,65	7,94	9,26	8,56	8,17
2 (n=5)	4,92	6,94	8,44	7,03	8,51	8,01	7,37
3 (n=6)	5,37	6,51	8,01	6,74	8,01	8,22	7,18
4 (n=10)	5,11	6,17	7,60	6,25	7,47	7,60	6,72
5 (n=7)	5,32	6,20	7,13	5,22	6,23	6,54	6,11
6 (n=7)	5,04	5,65	6,10	4,43	5,54	5,67	5,38
7 (n=9)	5,34	4,91	5,63	3,19	4,74	5,39	4,86



7. ábra. A becsült kor és a P<sub>1</sub>-es fogak koronamagasságának regressziója tolnai bakoknál (n=354)

### A becsült kor és a P<sub>2</sub>-es fogak kapcsolata


A cementum alapján becsült kor és a P<sub>2</sub>-es fog koronamagasságának kapcsolata statisztikailag igazolható. A P<sub>2</sub>-es fog az életkor előrehaladásával már folyamatosan kopik. A cementzónák száma alapján becsült kor és a P<sub>2</sub>-es fog koronamagasságának regresszióját a 8. ábra mutatja be.



8. ábra. A becsült kor és a P<sub>2</sub>-es fogak koronamagasságának regressziója tolnai bakoknál (n=354)

## A becsült kor és a P<sub>3</sub>-es fogak kapcsolata


A cementum alapján becsült kor és a P<sub>3</sub>-as fog koronamagasságának kapcsolata statisztikailag igazolható. Ennek regresszióját a 9. ábra mutatja be.



9. ábra. A becsült kor és a P<sub>3</sub>-as fogak koronamagasságának regressziója tolnai bakoknál (n=354)

## A becsült kor és a M<sub>1</sub>-es fogak kapcsolata


Az M<sub>1</sub>-es fog a fogsor közepén helyeződik, kopása az összes fog között a legerősebb, a legjobban korrelál az életkorral. A cementum alapján becsült kor és az M<sub>1</sub>-es fog koronamagasságának regresszióját a 10. ábra mutatja be.



10. ábra A becsült kor és a  $M_1$ -es fogak koronamagasságának regressziója tolnai bakoknál (n=354)

### A becsült kor és a $M_2$ -es fogak kapcsolata


A cementzónák száma alapján becsült kor és az  $M_2$ -es fog koronamagasságának kapcsolata is igen szoros, gyakorlatilag alig tér el az  $M_1$ -es fog adataitól. A cementum alapján becsült kor és az  $M_2$ -es fog koronamagasságának regresszióját a 11. ábra mutatja be.



11. ábra. A becült kor és a M<sub>2</sub>-es fogak koronamagasságának regressziója tolnai bakoknál (n=354)

### A becült kor és a M<sub>3</sub>-as fogak kapcsolata

Az M<sub>3</sub>-as fog koronamagassága is szoros kapcsolatot mutat a cementum alapján becült korrallal. Regresszióját a 12. ábra mutatja be.



12. ábra. A becült kor és a M<sub>3</sub>-as fogak koronamagasságának regressziója tolnai bakoknál (n=354)

A cementzónák száma alapján becsült kor és az alsó fogsori zápfogak koronamagasság-adatainak kapcsolatát regresszió- és korrelációanalízissel vizsgáltam meg. A 7-10. táblázat adataiból látható, hogy a cementum alapján becsült kor és az összes zápfog – a  $P_1$  kivételével – esetében a számított korrelációs koefficiens abszolút értéke meghaladja a 95 %-os valószínűség ( $P=0,05$ ;) mellett a kritikus korrelációs koefficiens értékét. A legerősebb az összefüggés az összes zápfogak átlagainál tapasztalható, minden minta esetében ( $r=0,9519$ ;  $0,9423$ ;  $0,9347$ ;  $0,9323$ ). Igen erős összefüggés figyelhető meg az  $M_1$ -nél ( $r=0,9438$ ;  $0,9310$ ;  $0,9289$ ;  $0,9093$ ), az  $M_2$ -nél ( $r=0,9444$ ;  $0,9248$ ;  $0,9207$ ;  $0,9059$ ) és az  $M_3$ -nál ( $r=0,9432$ ;  $0,9211$ ;  $0,9042$ ;  $0,9006$ ) egyaránt. A becsült kor és a moláris fogkoronák magasságának korrelációs koefficiensei hol az egyik, hol a másik fog esetében mutatnak magasabb értéket, de mivel a különbségek elhanyagolhatóak megállapítható, hogy gyakorlatilag azonos szorosságúnak tekinthetőek. A  $P_3$ -nál kiszámított korrelációs koefficiensek értékei ( $r=0,8992$ ;  $0,8992$ ;  $0,8978$ ;  $0,8903$ ) mindegyik mintában meghaladták a  $P_2$ -nél számított koefficiensekét ( $r=0,8597$ ;  $0,8576$ ;  $0,8458$ ;  $0,7686$ ). Az egyik minta esetében nem volt kimutatható kapcsolat a cementzónák alapján becsült kor és a  $P_1$  fogkorona magassága ( $r=-0,1285$ ) között. A másik három esetben a számított korrelációs koefficiens értékei meghaladták a számított kritikus együttható értékeit ( $r=-0,3266$ ;  $-0,2412$ ;  $-0,2394$ ), de ezek a koefficiensek annyira alacsonyak, hogy gyakorlatilag nem tájékoztatnak az életkorról.

Az adatok értékeléséből, a számított statisztikai jellemzőkből és az ábrákból levonható az a következtetés, hogy a mandibuláris zápfogak koronamagasságai igen jól mutatják a kor előrehaladását. A fog koronamagasságát befolyásolják az individuális adottságok (pl.: fogkeménység) és a környezeti tényezők fogkopásgyorsító – mérséklő hatásai (pl.: talaj jellemzők: homok – lösz, Ca-ban szegény – Ca-ban gazdag). A fogkorona magasságának adatai alapján életkort évre pontosan megbecsülni csak kis valószínűségű értékek mellett lehet, de az életkorról jó tájékoztatást nyújt.

#### 4.9. A cementzónák alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak kapcsolata

A cementzónák alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak kapcsolatát 468 őzbak és 90 őzsuta adatainak feldolgozásával vizsgáltam. A cementum alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak összesített adatait a 11-14. táblázaton mutatom be.

##### 11. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak összesített adatai tolnai őzbakoknál (n=339)

Cement z. kor (év)	I <sub>1</sub> koronama-gasság (mm)	I <sub>1</sub> nyakhossz (mm)	I <sub>1</sub> korona/nyak	I <sub>1</sub> kopott rész (mm)	I <sub>1</sub> korona belső hossza (mm)	I <sub>1</sub> korona kopott/belső (mm)
1 (n=17)	7,40	5,89	1,56	0,64	7,16	0,09
2 (n=37)	6,82	4,97	1,41	1,29	6,58	0,24
3 (n=67)	6,55	5,05	1,31	1,52	6,37	0,26
4 (n=68)	6,23	5,21	1,21	1,75	6,11	0,30
5 (n=72)	5,67	5,32	1,09	1,98	5,76	0,36
6 (n=31)	5,22	5,45	0,98	2,25	5,39	0,44
7 (n=25)	4,08	5,92	0,74	2,66	4,68	0,65
8 (n=10)	3,62	6,11	0,64	2,88	4,24	0,74
9 (n=10)	3,03	6,19	0,56	2,91	4,07	0,77
10 (n=2)	0,77	8,22	0,10	3,15	3,15	1,00
<b>x</b>	5,84	5,29	1,17	1,84	6,18	0,35
<b>Medián</b>	6,10	5,20	1,17	1,75	6,45	0,29
<b>Módusz</b>	6,05	5,40	1,40	1,50	6,50	1,00
<b>Minimum</b>	0	2,85	0	0,30	3,00	0,04
<b>Maximum</b>	8,25	9,35	5,05	4,10	8,40	1,00
<b>s</b>	1,46	0,80	0,43	0,72	1,37	0,22
<b>Variancia</b>	2,12	0,64	0,18	0,51	1,88	0,05
<b>r</b>	0,7323	0,4920	0,7048	0,7199	0,7092	0,7548
<b>r*(P=0,05)</b>				0,1779		
<b>r<sup>2</sup></b>	0,5363	0,2421	0,4968	0,5182	0,5030	0,5697
<b>f.t.</b>	par.	par.	par.	par.	par.	par.








## 14. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak összesített adatai békési őzbakoknál (n=56)

Cement z. kor (év)	I <sub>1</sub> koronamagasság (mm)	I <sub>1</sub> nyakhossz (mm)	I <sub>1</sub> korona/nyak	I <sub>1</sub> kopott rész (mm)	I <sub>1</sub> korona belső hossza (mm)	I <sub>1</sub> korona kopott/belső (mm)
1 (n=7)	7,57	4,76	1,59	0,86	7,09	0,12
2 (n=5)	6,82	5,09	1,34	0,97	6,44	0,15
3 (n=6)	6,60	5,12	1,37	1,32	6,12	0,22
4 (n=10)	6,31	4,97	1,28	1,65	6,02	0,27
5 (n=7)	6,24	5,53	1,16	2,01	5,89	0,35
6 (n=7)	5,77	5,56	1,04	1,92	5,80	0,34
7 (n=9)	5,59	5,44	1,03	2,51	4,86	0,53
8 (n=3)	3,62	6,07	0,61	2,63	4,28	0,63
9 (n=2)	2,95	6,05	0,49	2,35	4,10	0,60
<b>x</b>	6,09	5,29	1,18	1,75	5,81	0,33
<b>Medián</b>	6,45	5,17	1,15	1,80	5,9	0,30
<b>Módusz</b>	7,00	5,00	1,15	1,90	6,40	0,15
<b>Minimum</b>	2,70	3,30	0,43	0,60	3,35	0,09
<b>Maximum</b>	7,65	7,30	2,18	3,80	7,50	0,82
<b>s</b>	1,28	0,71	0,33	0,72	0,98	0,18
<b>Variancia</b>	1,63	0,50	0,11	0,51	0,95	0,03
<b>r</b>						
<b>r*(P=0,05)</b>				0,2593		
<b>r<sup>2</sup></b>	0,6002	0,2143	0,5895	0,6277	0,6265	0,6858
<b>f.t.</b>	par.	par.	par.	par.	par.	par.


A korrelációs koefficiens számított értékének abszolút értéke minden esetben meghaladja a kritikus korrelációs koefficiens értékét 95 %-os megbízhatósági szint (P=0,05; DF=36) mellett. Így a cementum alapján becsült kor és a fogkorona paraméterei között statisztikailag igazolható kapcsolat van.

A cementzónák alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak koronamagasságának regresszióját a tolnai bakok példáján a 13. ábra mutatja be. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,8564$ ;  $0,7747$ ;  $0,7323$ ;  $0,5847$ ) az őzsutáknál szoros, a bakoknál szoros, közepes és gyenge összefüggés is kimutatható volt a különböző élőhelyeken, annak ellenére, hogy az adatok érdemben nem tértek el egymástól.




13. ábra. A becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak koronamagasságának regressziója tolnai bakoknál (n=339)

A cementzónák alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak fognyakhosszának regresszióját a 14. ábra mutatja be. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,7046; 0,6007; 0,4921; 0,4629$ ) közepes és gyenge, de igazolható összefüggést mutat.



14. ábra. A becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak fognyakmagasságának regressziója tolnai bakoknál (n=339)


A cementrétegek alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak fogkorona/fognyakhosszának regresszióját a 15. ábra mutatja be.



15. ábra. A becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogakkorona/fognyakmagasság arányának regressziója tolnai bakoknál (n=339)


A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,8368$ ;  $0,7678$ ;  $0,7048$ ;  $0,6700$ ) közepes és gyenge, statisztikailag igazolható összefüggést mutat. A fogkorona és a fognyak arányának korrelációs koefficiens értékei kisebbek, mint a fogkoronáéi, így megállapítható, hogy a fogkorona/fognyak arány értékének ismerete nem tájékoztat jobban a korról, mintha csak a fogkorona hosszát vesszük figyelembe.

A cementrétegek alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak lingualis felületén kialakult kopott rész hosszának regresszióját a 16. ábra mutatja be. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,8790$ ;  $0,7923$ ;  $0,7199$ ;  $0,6002$ ) az őzsutáknál erős, a bakoknál közepes és gyenge, statisztikailag igazolható összefüggést mutat. Ha az őzsuták esetében kihagyjuk a fél évesek adatait, úgy ott is közepes erősségű összefüggést kaptunk.



16. ábra. A becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak lingualis kopott felület hosszának regressziója tolnai bakoknál (n=339)


A becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak lingualis koronamagasságának regresszióját a 17. ábra mutatja be. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,8535$ ;  $0,7915$ ;  $0,7092$ ;  $0,5717$ ) hasonlóan a I<sub>1</sub>-es fogak lingualis felületén kialakult kopott rész hosszának regressziójához a sutáknál erős, a bakoknál közepes és gyenge, statisztikailag igazolható összefüggést mutat. A suták adataiból, ha elhagyjuk a fél évesek értékeit, úgy a bakok adataihoz közelítő, közepes erősségű regressziót kapunk.



17. ábra. A becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak linguális koronamagasságának regressziója tolnai bakoknál (n=339)

A cementrétegek alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogakon kialakult kopott rész és a korona egész nyelvi felületének arányának regresszióját a 18. ábra mutatja be. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,8201; 0,8101; 0,7548; 0,6001$ ) közepes és gyenge, de statisztikailag igazolható regressziót mutat. A korrelációs koefficiens értéke a mintákban felerészt kismértékű emelkedést, felerészt kismértékű csökkenést mutat az I<sub>1</sub>-es fogak linguális felületén kialakult kopott rész hosszának vonatkozó értékeihez képest, így megállapítható, hogy az I<sub>1</sub>-es fogakon kialakult kopott rész és a korona egész nyelvi felületének aránya nem tájékoztat pontosabban az életkorról, mintha csak a kopott rész hosszának adatait vizsgáljuk.





18. ábra. A becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak lingualis koronamagasságának regressziója tolnai bakoknál (n=339)

A fentiek alapján megállapítható, hogy a metszőfogak egyetlen hosszúsági paramétere sem mutat olyan szoros regressziót, hogy az életkorról egzakt tájékoztatást nyújtson.

#### 4.10. A fogszög vizsgálata

A cementrétegek alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fog szögállásának kapcsolatát 566 adatpár segítségével vizsgáltam meg. A felvett adatok összesítését és feldolgozását 15-17. táblázat mutatja be.

## 15. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogszög kapcsolata őzbakoknál

Cement z. kor (év)	Tolnai bakok (n=345)	Lajtai bakok (n=77)	Békési bakok (n=56)
	I <sub>1</sub> fogszög (°)		
<b>1</b>	54,76 (n=17)	60,22 (n=9)	55,29 (n=7)
<b>2</b>	56,56 (n=39)	54,43 (n=7)	56,40 (n=5)
<b>3</b>	55,98 (n=69)	57,80 (n=15)	58,17 (n=6)
<b>4</b>	57,31 (n=68)	58,54 (n=11)	54,00 (n=10)
<b>5</b>	59,24 (n=73)	57,94 (n=18)	58,61 (n=7)
<b>6</b>	59,24 (n=31)	60,05 (n=8)	50,79 (n=7)
<b>7</b>	60,08 (n=25)	60,60 (n=5)	57,67 (n=9)
<b>8</b>	60,90 (n=10)	64,67 (n=3)	60,67 (n=3)
<b>9</b>	62,18 (n=11)	65,00 (n=1)	62,50 (n=2)
<b>10</b>	57,00 (n=2)	-	-
<b>x</b>	57,87	58,74	56,25
<b>Medián</b>	58,00	59,00	58,00
<b>Módusz</b>	54,00	59,00	58,00
<b>Minimum</b>	42,00	44,00	41,00
<b>Maximum</b>	74,00	68,00	68,00
<b>s</b>	5,58	5,03	5,30
<b>Variancia</b>	31,08	25,30	28,10
<b>r</b>	0,2844	0,1393	0,1063
<b>r*(P=0,05)</b>	0,1779	0,2216	0,2593
<b>r<sup>2</sup></b>	0,0809	0,0194	0,0113
<b>f.t.</b>	log.	log.	log.

16. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogszög kapcsolata őzsutáknál


Cement z. kor (év)	I <sub>1</sub> fogszög (°) tolnai őzsutáknál (n=88)
0,5 (n=16)	45,94
1,5 (n=12)	51,33
2,5 (n=12)	50,91
3,5 (n=9)	53,44
4,5 (n=13)	47,38
5,5 (n=10)	50,80
6,5 (n=3)	58,33
7,5 (n=9)	56,78
8,5 (n=3)	54,33
9,5 (n=1)	64,00
<b>x</b>	50,91
<b>Medián</b>	51,00
<b>Módusz</b>	51,00
<b>Minimum</b>	33,00
<b>Maximum</b>	71,00
<b>s</b>	7,03
<b>Variancia</b>	49,46
<b>r</b>	0,3755
<b>r*(P=0,05)</b>	0,2074
<b>r<sup>2</sup></b>	0,1410
<b>f.t.</b>	log.

17. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogszög kapcsolatának statisztikai jellemzői őzsutáknál a félévsek kihagyásával

Cement z. kor (év)	I <sub>1</sub> fogszög (°) tolnai őzsutáknál a félévsek kihagyásával (n=72)
<b>x</b>	52,01
<b>Medián</b>	51,00
<b>Módusz</b>	50,00
<b>Minimum</b>	38,00
<b>Maximum</b>	71,00
<b>s</b>	6,24
<b>Variancia</b>	39,00
<b>r</b>	0,2156
<b>r*(P=0,05)</b>	0,2290
<b>r<sup>2</sup></b>	0,0465
<b>f.t.</b>	log.

A cementum alapján becsült kor és a fogszög kapcsolatát jellemző korrelációs koefficiens számított értéke a bakok esetében csak a tolnai mintában és csak igen kis mértékben ( $r=0,2844$ ) haladja meg a kritikus értéket, ahol a mintaelemszám is igen magas ( $n=345$ ). A másik két minta korrelációs koefficiense ( $r=0,1393$ ;  $0,1063$ ) nem éri el a 95 %-os megbízhatóság mellett a kritikus korrelációs koefficiens értékét, így ezekben az esetekben statisztikailag igazolható kapcsolat nem mutatható ki. A suták adatait vizsgálva megállapítható, hogy kis mértékben meghaladja a számított korrelációs koefficiens ( $r=0,3755$ ) a kritikus táblázati értéket, így gyenge statisztikailag igazolható kapcsolat megállapítható. A számításokat elvégeztem a fél évesek kihagyásával is, és ebben az esetben a korrelációs koefficiens ( $r=0,2156$ ) már alatta marad a kritikus értéknek. Ebből levonható az a következtetés, hogy a suták esetében egy éves kor után nem növekszik statisztikailag kimutatható módon az I<sub>1</sub>-es fogak szöge. A becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak szögének regresszióját a 19. ábra mutatja be a tolnai bakok mintáján.



19. ábra. A becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak szögének regressziója tolnai bakoknál ( $n=345$ )

#### 4.11. A cementzónák alapján becsült kor és a fogsorhossz kapcsolata

A cementum alapján becsült kor és a mandibuláris fogsorhossz kapcsolatának vizsgálatát 498 őzbak és 127 őzsuta adatai alapján végeztem el, melynek eredményeit a 18-20. táblázatban mutatom be.

18. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és a mandibuláris fogsorhossz kapcsolata őzbakoknál

Cement z. kor (év)	Tolnai bakok (n=354)	Lajtai bakok (n=89)	Békési bakok (n=55)
	Mandibuláris fogsorhossz (mm)		
<b>1</b>	69,32 (n=17)	67,15 (n=10)	68,46 (n=7)
<b>2</b>	67,05 (n=39)	67,09 (n=9)	67,65 (n=5)
<b>3</b>	66,87 (n=70)	66,92 (n=16)	67,38 (n=6)
<b>4</b>	66,59 (n=70)	65,19 (n=12)	66,41 (n=10)
<b>5</b>	65,08 (n=76)	65,63 (n=19)	66,05 (n=7)
<b>6</b>	64,12 (n=32)	65,70 (n=9)	64,74 (n=7)
<b>7</b>	64,38 (n=25)	64,70 (n=6)	65,78 (n=9)
<b>8</b>	63,42 (n=11)	63,30 (n=3)	64,02 (n=3)
<b>9</b>	62,09 (n=11)	64,30 (n=2)	63,90 (n=1)
<b>10</b>	64,37 (n=2)	-	-
<b>x</b>	65,79	65,86	66,31
<b>Medián</b>	65,90	65,95	66,35
<b>Módusz</b>	65,20	64,90	68,80
<b>Minimum</b>	38,63	60,10	62,70
<b>Maximum</b>	73,80	71,30	71,05
<b>s</b>	3,01	2,37	2,16
<b>Variancia</b>	9,03	5,62	4,65
<b>r</b>	0,5411	0,4301	0,5763
<b>r*(P=0,05)</b>	0,1779	0,2062	0,2593
<b>r<sup>2</sup></b>	0,2928	0,1850	0,3321
<b>f.t.</b>	par.	par.	par.

19. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és a mandibuláris fogsorhossz kapcsolata őzsutáknál

Cement z. kor (év)	Mandibuláris fogsorhossz tolnai őzsutáknál (mm) (n=127)
0,5 (n=37)	56,59
1,5 (n=17)	66,70
2,5 (n=18)	66,48
3,5 (n=11)	67,03
4,5 (n=14)	65,90
5,5 (n=12)	64,00
6,5 (n=2)	64,80
7,5 (n=9)	65,37
8,5 (n=5)	62,75
9,5 (n=2)	62,30
<b>x</b>	63,06
<b>Medián</b>	64,80
<b>Módusz</b>	64,80
<b>Minimum</b>	50,50
<b>Maximum</b>	72,40
<b>s</b>	5,43
<b>Variancia</b>	29,50
<b>r</b>	0,6492
<b>r*(P=0,05)</b>	
<b>r<sup>2</sup></b>	0,4215
<b>f.t.</b>	par.


20. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és a mandibuláris fogsorhossz kapcsolatának statisztikai jellemzői őzsutáknál a félévesek kihagyásával

Cement z. kor (év)	Mandibuláris fogsorhossz tolnai őzsutáknál a félévesek kihagyásával (mm) (n=90)
<b>x</b>	65,89
<b>Medián</b>	66,20
<b>Módusz</b>	64,80
<b>Minimum</b>	58,90
<b>Maximum</b>	72,40
<b>s</b>	2,51
<b>Variancia</b>	6,30
<b>r</b>	0,4195
<b>r*(P=0,05)</b>	
<b>r<sup>2</sup></b>	0,1760
<b>f.t.</b>	par.

A bakok esetében a korrelációs koefficiensek abszolút értéke ( $r=0,5763$ ;  $0,5411$ ;  $0,4301$ ) mindhárom esetben meghaladta a kritikus értéket, így a cementzónák

nák alapján becsült kor és a fogsorhosszak között 95 %-os megbízhatóság mellett gyenge kapcsolat ( $P=0,05$ ) igazolható a vizsgált minták alapján. A suták teljes adatsorát vizsgálva kismértékben magasabb korrelációs koefficiens ( $r=0,6492$ ) számítottam ki. A félévesek adatainak elhagyásával ugyanezen érték már csak  $r=0,4195$ . A cementzónák száma alapján becsült kor és a mandibuláris fogsorhossz kapcsolatát 20. ábrán mutatom be a tolnai bakok mintáján.



20. ábra. A becsült kor és a fogsorhossz regressziója tolnai bakoknál ( $n=354$ )

#### 4.12. A cementrétegek alapján becsült kor és a foghíjas szélhosszának kapcsolata

A cementrétegek alapján becsült kor és a foghíjas szél hosszának kapcsolatát 433 őzbak és 129 őzsuta esetében vizsgáltam meg. Az adatokat összesítve és értékelve a 21-23. táblázatban mutatom be.

21. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és a foghézag hosszának kapcsolata őzbakoknál

Cement z. kor (év)	Tolnai bakok (n=350)	Lajtai bakok (n=83)
	Diasthema hossz (mm)	
1	39,36 (n=17)	40,47 (n=10)
2	42,11 (n=39)	41,73 (n=9)
3	42,31 (n=71)	41,32 (n=16)
4	43,19 (n=70)	41,53 (n=11)
5	42,79 (n=74)	42,14 (n=18)
6	43,35 (n=31)	42,39 (n=9)
7	43,43 (n=25)	43,83 (n=6)
8	42,18 (n=11)	43,33 (n=3)
9	44,41 (n=10)	43,90 (n=1)
10	43,37 (n=2)	-
x	42,66	1,87
Medián	42,75	42,00
Módusz	42,70	42,30
Minimum	30,30	37,50
Maximum	49,90	49,30
s	2,72	2,25
Variancia	7,40	5,04
r	0,2811	0,3338
r*(P=0,05)	0,1779	0,2135
r <sup>2</sup>	0,0790	0,1114
f.t.	log.	log.



## 22. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és a mandibuláris fogsorhossz kapcsolata őzsutáknál


Cement z. kor (év)	A diasthemahossz tolnai őzsutáknál (mm) (n=129)
0,5 (n=38)	34,88
1,5 (n=16)	39,49
2,5 (n=17)	41,88
3,5 (n=11)	42,03
4,5 (n=15)	41,88
5,5 (n=13)	41,92
6,5 (n=3)	44,88
7,5 (n=10)	41,82
8,5 (n=4)	42,09
9,5 (n=2)	41,32
<b>x</b>	39,60
<b>Medián</b>	4,20
<b>Módusz</b>	36,60
<b>Minimum</b>	21,93
<b>Maximum</b>	46,85
<b>s</b>	4,11
<b>Variancia</b>	16,91
<b>r</b>	0,7337
<b>r*(P=0,05)</b>	0,5383
<b>r<sup>2</sup></b>	0,4215
<b>f.t.</b>	log.

## 23. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és a mandibuláris fogsorhossz kapcsolatának statisztikai jellemzői őzsutáknál a félévések kihagyásával

Cement z. kor (év)	A diasthemahossz tolnai őzsutáknál a félévések kihagyásával (mm) (n=90)
<b>x</b>	41,57
<b>Medián</b>	41,70
<b>Módusz</b>	40,60
<b>Minimum</b>	33,05
<b>Maximum</b>	46,85
<b>s</b>	2,68
<b>Variancia</b>	7,18
<b>r</b>	0,2866
<b>r*(P=0,05)</b>	0,2050
<b>r<sup>2</sup></b>	0,0821
<b>f.t.</b>	log.

A bakok esetében a számított korrelációs koefficiens értéke ( $r=0,3338$ ;  $0,2811$ ) meghaladja a kritikus korrelációs koefficiens értékét. Így a cementum alapján becsült kor és a foghézag hossza között statisztikailag igazolható gyenge kapcsolat van a bakoknál. A suták teljes adatsora alapján számított korrelációs koefficiens értéke ( $r=0,7337$ ) közepes erősségű kapcsolatra utal. A félévesek kihagyásával számított ( $r=0,2866$ ) értéke jóval alacsonyabb, a bakokéhoz hasonló érték. A becsült kor és a diasthema hossz regresszióját a 21. ábrán mutatom be.



21.ábra. A fogcsiszolatok alapján becsült kor és a diasthema regressziója (n=350)

### 4.13. A cementrétegek alapján becsült kor és a szemlencse tömegének kapcsolata

A cementrétegek alapján becsült kor és a szemlencse tömegének kapcsolatát 86 őzbak és 127 őzsuta esetében volt lehetőségem vizsgálni. A fogcsiszolatok alapján becsült kor és a szemlencse nedves, 60 °C-on és 105 °C-on szárított tömegének adatait és az adatsorok főbb statisztikai jellemzőit a 24-25. táblázatban mutatom be.

24. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és a szemlencse tömegének kapcsolata őzbakoknál


Cement z. kor (év)	A szemlencse tömege (mg) őzbakoknál (n=86)		
	105 °C	60 °C	nedves
<b>1</b> (n=10)	310	350	952
<b>2</b> (n=9)	295	340	946
<b>3</b> (n=16)	334	379	1051
<b>4</b> (n=12)	314	350	1014
<b>5</b> (n=19)	347	390	1048
<b>6</b> (n=9)	330	384	1035
<b>7</b> (n=6)	330	426	996
<b>8</b> (n=3)	354	421	1052
<b>9</b> (n=2)	292	318	953
<b>x</b>	326	374	1015
<b>Medián</b>	323	255	1011
<b>Módusz</b>	315	413	1111
<b>Minimum</b>	168	187	534
<b>Maximum</b>	457	865	1727
<b>s</b>	58	97	183
<b>Variancia</b>	3364	9409	33489
<b>r</b>	0,1703	0,1738	0,1752
<b>r*(P=0,05)</b>		0,2100	
<b>r<sup>2</sup></b>	0,0290	0,0302	0,0307
<b>f.t.</b>	log.	log.	log.

## 25. táblázat

A cementzónák alapján becsült kor és a szemlencse tömegének kapcsolata őzsutáknál

Cement z. kor (év)	A szemlencse tömege (mg) őzsutáknál (n=127)		
	105 °C	60 °C	nedves
<b>0,5</b> (n=37)	189	205	486
<b>1,5</b> (n=15)	297	316	715
<b>2,5</b> (n=16)	331	350	793
<b>3,5</b> (n=11)	316	337	755
<b>4,5</b> (n=14)	346	370	801
<b>5,5</b> (n=13)	325	346	768
<b>6,5</b> (n=3)	313	342	630
<b>7,5</b> (n=11)	403	429	935
<b>8,5</b> (n=5)	391	403	862
<b>9,5</b> (n=2)	386	414	840
<b>x</b>	294	315	702
<b>Medián</b>	315	333	745
<b>Módusz</b>	181	220	900
<b>Minimum</b>	89	89	220
<b>Maximum</b>	463	488	1080
<b>s</b>	84	87	181
<b>Variancia</b>	7056	7569	32761
<b>r</b>	0,8438	0,8349	0,7694
<b>r*(P=0,05)</b>		0,1779	
<b>r<sup>2</sup></b>	0,7120	0,6971	0,5920
<b>f.t.</b>	log.	log.	log.


A fogcsiszolatok alapján becsült kor és a szemlencse tömegek korrelációs koefficienseinek értékei ( $r=0,1703$ ;  $0,1738$ ;  $0,1752$ ) a bakok esetében minden esetben alatta maradtak a kritikus korrelációs koefficiensnek, azaz ezek alapján megállapítható, hogy a vizsgált mintában statisztikailag igazolható kapcsolat e két paraméter között nem volt. Mindebből levonható az a következtetés, hogy a bakok esetében a szemlencse szárazanyag tartalmának növekedése egy éves korig erőteljes, azt követően statisztikailag elhanyagolható mértékű. A becsült kor és a szemlencse 105 °C-on szárított tömegének regresszióját a bakok esetében a 22., suták esetében a 23. ábra mutatja be.



22. ábra. A becsült kor és a szemlencse 105 °C-on szárított tömegének regressziója lajtai bakoknál (n=86)

A suták adatainknak értékelése során számított korrelációs koefficiensek értékei jóval magasabbak ( $r=0,8438$ ;  $0,8349$ ;  $0,7694$ ), mint a bakok vonatkozó értékei. Ezek alapján a becsült kor és a szemlencse tömegek között közepes szorosságú, statisztikailag igazolható kapcsolat volt kimutatható. Ennek elsősorban az az oka, hogy a suták mintája tartalmazza a testileg nem kifejlett, fél éves egyedeket is és elsődlegesen ezeknek az egyedeknek köszönhető a relatív magas korrelációs koefficiens. A fogcsiszolatok alapján becsült kor és a 105 °C-on szárított szemlencsetömegek kapcsolatát érkeltem a fél évesek adatainak kihagyásával is. A korrelációs koefficiens ekkor már csupán ( $r=0,4840$ ;  $DF=89$ ;  $r^*=0,2050$ ) gyenge statisztikailag igazolható kapcsolatot mutat. Amikor a másfél éveseket is kihagytam a számításból a korrelációs koefficiens ( $r=0,3933$ ;  $DF=76$ ;  $r^*=0,2216$ ) még gyengébb, de még statisztikailag igazolható kapcsolatot mutatott. A két és fél évesek ( $r=0,4840$ ;  $DF=58$ ;  $r^*=0,2523$ ), a három és fél évesek ( $r=0,4532$ ;  $DF=47$ ;

$r^*=0,2790$ ) és a négy és fél évesek ( $r=0,5626$ ;  $DF=33$ ;  $r^*=0,3291$ ) elhagyásakor még szignifikáns kapcsolat igazolható. Ezt követően az öt és fél évesek ( $r=0,3209$ ;  $DF=20$ ;  $r^*=0,4132$ ), illetve a hat és fél évesek ( $r=0,1836$ ;  $DF=18$ ;  $r^*=0,4329$ ) elhagyásakor, a vizsgált paraméterek között kapcsolat nem mutatható ki.



23. ábra. A becsült kor és a szemlencse 105 °C-on szárított tömegének regressziója tolnai őzsutáknál (n=127)

A fentiek alapján megállapítható, hogy míg a bakok esetében a szemlencse szárazanyag-tömegének gyarapodása egy éves korra gyakorlatilag megáll, vagy csak rendkívül kis mértékben gyarapszik, addig a suták esetében ez a növekedés, ha kismértékben is de még évekig, körülbelül 5 éves korig elhúzódik.

## 5. Megvitatás

### 5.1. *Korbecslés a cement- és a dentinállomány növekedési vonalai alapján*

A szakirodalomban (MICHELL, 1963, 1967; SZABIK, 1973; AITKEN, 1975; KOVÁCS ÉS FELEK, 1991; CEDERLUND ET AL. 1991) általában a mandibuláris M<sub>1</sub>-es fog korbecslési célú cementum felhasználására találunk javaslatokat. Tapasztalataim alapján is a legjobban értékelhető rétegződés rendre az M<sub>1</sub>-es fog gyökérívének transzverzális csiszolatán fordult elő, de az M<sub>2</sub>-es fog transzverzális csiszolatán is jól láthatóak a zónák, az M<sub>3</sub>-on általában gyengén. Előfordult olyan eset is, hogy a gyökérívben értékelhető rétegződés nem volt megfigyelhető. Ekkor a gyökerek alsó negyedének környékén készített horizontális csiszolaton megfigyelt rétegeket vettem figyelembe, elsősorban az M<sub>1</sub>-es fogon, de ha ez nem volt értékelhető úgy ezt a többi fognál is megvizsgáltam. Vizsgálataim szerint – PRIOR (1968) véleményével megegyezően – a kihasadó fog nem teljesen kifejlődött gyökerén, a kihasadás évében megfigyelhető a foggyökéren és különösen a gyökérívben a cementállomány képződésének megindulása. Az elsőként kialakuló áttetsző sárga zónában esetenként fehéres beszűrődés is látható. A következő években a cementállomány vastagodásának a vegetációs időszakban fehérszínű, opálos, vastagabb, télen sárgás áttetsző vékonyabb zóna képződik. Így, alátámasztottnak látom saját megfigyeléseim alapján AITKEN (1975) megállapítását, miszerint a fehér zónák megszámlálásával megkapjuk az életkort években kifejezve.

A cementum szövettani vizsgálatainak értékelése során úgy találtam, hogy KLEVEZAL ÉS KLEINENBERG (1967), SZABIK (1973) és KOVÁCS ÉS FELEK (1991) által javasolt haematoxin-eosin festés ugyan használható eljárás, de a Giemzával festett metszetek jobban értékelhetőek és az elkészítésük technikai kivitelezése sem nehezebb. A Heidenhain-féle azan, a Goldner-féle trikróm-festés szintén jóval

kedvezőbben értékelhető és differenciáltabb képet ad, mint a haematoxilin-eosin, de ezek a festési eljárások ma már a legtöbb orvosi szövettani laborban nem elérhetőek, így gyakorlati kivitelezésük nehezebben megvalósítható. A secundaer dentin hisztotechnikai értékeléséről ugyanaz mondható el, mint a cementuméről. A növekedési vonalak száma az általam vizsgált mintában megegyezett a fogcsiszolatok cementuma alapján becsült korról, ami alátámasztja KLEVEZAL ÉS KLEINENBERG (1967) megállapítását, miszerint a secundaer dentin zónáinak száma azonos az őz években kifejezett életkorával.

A cementum életkorbecslési célú elektronmikroszkópos vizsgálatával kapcsolatos szakirodalmi hivatkozást nem találtam, de sajnos ezzel az eljárással zónákat nem sikerült kimutatnom.

## **5.2. A fogváltás**

Saját megfigyeléseim szerint a fogváltás az őz 12 hónapos korára befejeződik. Mindezekből következik, hogy a fogváltás alapján csak egyéves korig tudjuk az életkort pontosan becsülni. Ez megerősíti PRIOR (1968) és BIEGER (cit.: SZÉKY, 1979) vizsgálatainak eredményét.

## **5.3. A fogkopás**

MEÁK ÉS SZEDERJEI (1957) szerint a fogkopás alapján becsült kor a tényleges életkorral 70-80 %-ban is megegyezhet. Vizsgálataim ezt alátámasztják, mivel a fogcsiszolatok cementzónáinak száma alapján becsült kor és a fogkopás alapján becsült kor a bakok esetében különböző populációkban 75,00-87,64 %-ban egyezik meg. A suták esetében a megegyezés 78,10 % volt. Ezek az adatok nagymértékben közelítenek AITKEN (1975) eredményeihez is, mivel vizsgálatában a cementzónák alapján becsült kor és a fogkopás alapján becsült kor 63,5%-ban egyezett meg, és 90,5%-ban egy éven belül volt az eltérés a két módszerrel becsült kor között. Szin-



tén nem mutat jelentős eltérést CEDERLUND ET AL. (1991) ismert korú egyedek vizsgálatának adataihoz képest.

#### **5.4. A zápfogak koronamagassága**

STUBBE ÉS LOCKOW (cit.: VARGA, 1996) az  $M_1$ -es fogak fogkoronamagassága és a becsült életkor között szoros negatív korrelációt talált, amelynek abszolút értéke  $r=0,855$ . CEDERLUND ET AL. (1991) a kor és az  $M_1$ -es fogak koronamagasságának regressziójánál a korrelációs koefficiens abszolút értéke  $r=0,66$ -nak bizonyult. ASHBY ÉS HENRY (1979) vegyes ivarú őzek vizsgálatokor lineáris regresszióanalízissel jellemezték a becsült kor és a mandibuláris  $M_1$ -es fogak koronamagasságát. Számításuk szerint korrelációs koefficiens abszolút értéke  $r=0,86$ . Ez szoros, statisztikailag igazolható kapcsolatot jelent.

Jelen vizsgálatban ennél némileg szorosabb kapcsolatot találtam az  $M_1$ -es fogak koronamagasságának vizsgálata során. Vizsgálataim során bakoknál különböző élőhelyeken a korrelációs koefficiens értéke  $r=0,9093$ ;  $0,9289$ ;  $0,9438$  volt. Sutáknál ennek értéke  $r=0,9310$ -nek bizonyult. A szorosabb összefüggés okait az alábbiakban foglalom össze.

1. Másodfokú regressziót használtam a lineáris helyett, ez önmagában indokolja a szorosabb korrelációs koefficiens értékét.
2. A ivarokat elkülönítve értékeltem.
3. Az analíziseket élőhelyi bontásban értékeltem.

#### **5.5. A metszőfogak szögállása**

A metszőfogak szögállásának a korrallal előrehaladó növekedésével kapcsolatosan BIEGER (1939 cit.: MEÁK és SZEDERJEL, 1957) közölt adatokat. Eredményeit egzaktul nem tudtam saját vizsgálatom eredményeivel összehasonlítani, ugyanis

statisztikai feldolgozást nem közölt. Adatai arra utalnak, hogy a metszőfogak dőlésszöge a korról monoton növekedést mutat. Ezt vizsgálataim nem támasztják alá, ugyanis az általam vizsgált populációk egy részében a korrelációs koefficiensek éppen hogy meghaladják a kritikus értéket, más részük ennek alatta van, és az adatsorok relatív szórása is igen magas. Tehát vagy csak rendkívül laza kapcsolat fordult elő vagy nem is volt kimutatható kapcsolat. Így megállapítható, hogy a kor és a metszőfogszög között a gyakorlat számára hasznosan felhasználható, érdemi kapcsolat nincs, s ez a paraméter az életkorról egyedi szinten, gyakorlatilag nem nyújt tájékoztatást.

### **5.6. A szemlencse száraz tömege**

MARINGGELE (1979) a becsült kor és a szemlencse száraz tömegének kapcsolatát vizsgálta, és megállapítja a szemlencse száraz tömegének növekedését, de adatai statisztikai értékelését nem végezte el. ANGIBAULT ET AL. (1993) ismert korú őzek vizsgálata során a kor és a szemlencsetömegek kapcsolatát megvizsgálva rendkívül szoros regressziót mutattak ki. A bakok esetében a korrelációs koefficiens értéke  $r=0,969$ , míg a sutáknál  $r=0,967$  volt.

Vizsgálataim során a bakoknál nem sikerült statisztikailag igazolható kapcsolatot kimutatni, a korrelációs koefficiens  $r=0,1703$  volt. Ennek az lehet az oka, hogy bakok esetében csak egyéves és ennél idősebb egyedek vizsgálatát volt lehetőségem elvégezni, és az adatok arra utalnak, hogy egy éves kor felett érdemi szemlencsetömeg növekedés nem tapasztalható. A sutáknál a kor és a 105 °C-on szárított szemlencse tömegének értékelése során  $r=0,8438$ -as korrelációs koefficiens értéket számítottam ki. E markáns különbség egyrészt azzal magyarázható, hogy a sutáknál fél év körüli egyedek nagyszámú vizsgálatát is el tudtam végezni, amikor a szemlencse növekedése igen intenzív. Másrészt hozzájárul a különbséghez az is, hogy a sutáknál, ha kis mértékben is, de kimutatható növekedés figyelhető meg kb. 5 éves korig.

### 5.7. *Az orrsövény elcsontosodása*

Az orrsövény elcsontosodásának segítségével RAJNIK (1977) alapján következtethetünk a korra. A korábbi szakirodalomban a módszer statisztikai jellemzésére nem találunk utalást, csak szubjektív értékelést. Saját vizsgálataim szerint a centzónák száma alapján becsült kor és az orrsövény alapján becsült kor szoros statisztikailag igazolható kapcsolatot mutat a suták esetében. A vizsgálatomban a korrelációs koefficiens értéke  $r=0,8841$ -nek bizonyult.

### 5.8. *A trófeabírálati korbecslés*

A cementum alapján becsült kor és a trófeabírálati kor az egyik mintaterületen 35,96 %-ban, a másik területen 39,28 %-ban egyezett meg. Az egyik mintaterületen a maximális eltérés 6 év, a másik területen nyolc év volt. Ezek az adatok némileg szorosabb összefüggést mutatnak, mint KOVÁCS ÉS FELEK (1991) adatai, aminek az lehet az oka, hogy KOVÁCS ÉS FELEK (1991) zárt téri viszonyok között élő őzek vizsgálatával tesztelték e módszer pontosságát és megbízhatóságát. Mivel az őz zárttéri tartása során rendszeresen fellépnek kisebb-nagyobb mértékű magatartási zavarok, továbbá a takarmányozás sem azonos a szabadtéri táplálkozással, feltehető, hogy sem az agancsfejlődés, sem a fogkopás nem lehet azonos a szabadterivel. Mindezek a tények magyarázzák az adatokban rejlő különbségeket.

## 6. Következtetések és javaslatok

### 6.1. *Következtetések és javaslatok a korbecslési módszerek kutatási célú alkalmazásához*

A vadbiológiai kutatások során mindig a vizsgálatok igényességének jellege határozza meg, hogy melyik korbecslési módszert alkalmazzák. Legegyszerűbben a trófeabírálati kor alkalmazható, mivel az őzbak trófeájának bírálatakor annak korát is megbecsülik. A fogkopás alapján végzett korbecsléskor ismerni kell a fogkopás morfológiáját, és gyakorlat is szükséges a korbecslés elfogadható pontosságú elvégzéséhez. A cementzónák alapján végzett becsléshez csiszoló berendezés szükséges a preparátumok elkészítéséhez, és sztereó mikroszkóp a preparátumok értékeléséhez. A legpontosabban a szövettani metszetek tájékoztatnak a korról, de a metszetek elkészítéséhez szövettani laboratóriumi háttérre is szükség van. Tehát a pontosság növeléséhez egyre nagyobb idő, energia- és pénzbefektetés szükséges.

Általánosságban javasolható (pl.: szaporodásbiológiai vizsgálatoknál), hogy legalább a fogkopás alapján becsült kort vegyék figyelembe, mert a trófeabírálati korbecslés eredményei pontatlanok, továbbá a nőivarú vad, trófeája nem lévén trófeabírálati korról sem rendelkezik. Ha bizonytalanok vagyunk a fogkopás alapján végzett korbecsléskor, akkor inkább lefelé kerekítsük a kort, mivel a gyakorlatban azt legtöbbször a fogkopás alapján túlbecsülik a cementzónák alapján becsülthöz képest. A fogkopás alapján precízen végzett korbecslés kismértékben tér el a cementzónák alapján becsült kortól, így a vadbiológiai kutatás igényeit általában kielégíti.

Ha a vizsgálatnál igen pontos korra van szükség, javasolható, hogy a cementum alapján végezzék a korbecslést akár csiszolatok, akár hisztotechnikai módszerek segítségével.

## **6.2. Következtetések és javaslatok a gyakorlati vadgazdálkodás számára**

Az alábbiakban a gyakorlati vadgazdálkodási tevékenységek végzéséhez használható következtetéseimet foglalom össze.

### **6.2.1. Következtetések és javaslatok a terepi korbecsléshez**

A vizsgált mintában a terepen becsült kor aránylag szoros korrelációban volt a cementállomány alapján becsült korról és a fogkopás alapján becsült korról is. A korrelációs koefficiens nem maradt el a trófeabírálati kor hasonló korrelációs koefficiensének értékeitől. Ezek szerint a precíz, alapos hivatásos vadász a kort az élő vadnál körülbelül olyan pontosan becsüli, mint a trófeabíró a trófeán.

Javasolható szakképzett, munkáját pontosan és körültekintően végző, a vadállományért és a munkájáért felelősséget érző hivatásos vadász alkalmazása, aki a testtájarányok, az agancs felépítése, az élőhely és a populáció sajátosságainak figyelembe vételével végzi a terepi korbecslést.

Elmondható, a vizsgált minták alapján, hogy a szakszerűen becsült kor pontossága megfelel a vele szemben elvárt igényeknek.

### **6.2.2. Következtetések és javaslatok a trófeabírálati korbecsléshez**

A vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy a cementzónák alapján becsült korhoz a fogkopás alapján becsült kor közelít a legjobban. Ellenben trófeabírálati kor a cementum alapján becsült korról statisztikailag igazolható, de erősnek nem mondható kapcsolatot nem mutatott 95 %-os valószínűség mellett.

A trófeabírálati korbecslés pontatlanságának okai, hogy a trófeabírálaton a kort legtöbbször az agancs jellege, a koszorúk és az agancstő dőlése, a koponyacsont vastagsága és a koponyavarratok elcsontosodása alapján becsülik. Mivel e

módszerek gyenge, legfeljebb közepes erősségű kapcsolatba hozhatók a korrall, a pontos becslést nem teszik lehetővé. A pontatlansághoz hozzájárul a mínusz pontok elkerülésének lehetősége (erre a túlbecsült korok utalnak), a sokszor felületesen végzett bírálat (erre az alul- és a túlbecslés is utal). A kiskoponyás trófeabírálatkor sokszor nem követelik meg a levágott koponyarész bemutatását, vagy azt nem veszik figyelembe. Így a fogkopás mértékének alapulvétele nem tudja pontosítani a becslt kort.

Ezek alapján javasolható, hogy a trófeabírálaton a vadászati hatóság, vagy csak nagy koponyával, vagy a szabályosan kiskoponyára levágott trófeát a levágott rész bemutatásával egyidejűleg bírálja el. Ezt a korábbi vadászati végrehajtási rendelet (30/1997.(IV.30.)FM rendelet) kötelezően előírta, de sajnálatosan az új 79/2004(V.4.)FVM rendelet ezt nem írja elő. Ezáltal lehetőség van a fogkopás nagyobb hangsúlyú figyelembe vételére, s ez – vizsgálataim szerint – pontosítani fogja a trófeabírálati kort. Tehát a fogsor jelenlétét meg kellene követelni a hivatalos trófeabírálaton és a becslt kor kialakításához a legjelentősebb hangsúllyal érdemes figyelembe venni. Ennek oka a fentiekén kívül még az is, hogy a fogazat, mint a táplálkozás nélkülözhetetlen részének elhasználódásának foka, a még várható élettartamot alapvetően meghatározza. Így egyfajta biológiai korként is értelmezhető a fogkopás alapján becslt kor.

Trófeabírálat során a kor megállapítását nem befolyásolja túlzottan az agancs fejlettségi állapota, mivel az egyedek kulminációja sokszor jelentősen eltérő életkorban következik be.

Amennyiben a leírt javaslatok figyelembevételével becslük a kort a trófeabírálat során, a korbecslési eljárások vizsgálataim szerint pontosabbak lesznek.

## 7. Összefoglalás

Az őz életkora a hivatásos és a sportvadászt, a vadbiológust és a trófeabírálot egyaránt érdekli. A szakszerű állománykezeléshez elengedhetetlen a korbecslési módszerek ismerete. A hivatalos trófeabírálat során az életkor évre pontos megállapítása kötelező, holott a kort csak egy éves korig lehet pontosan megállapítani (PRIOR, 1994), ettől kezdődően a kort csak becsülni lehet a korbecslési módszerek segítségével.

A dolgozat célja volt annak megállapítása, hogy a magyarországi habitatokban élő őz cement- és pótdentin-állománya létrehoz-e az életkor becslésére alkalmas rétegződéseket. Céлом volt továbbá, hogy a korábban szubjektív módon, vélekedéssel értékelt korbecslési módszereket és korra utaló bélyegeket megvizsgáljam, és azok megbízhatóságát és jellemzőit egzakt módon matematikai-statisztikai (biometriai) elemzésnek vessem alá. Ennek eredményeképpen a korbecslési módszerek megbízhatósága és pontossága megállapítható, melynek alapján gyakorlati alkalmazhatóságuk objektív alapokon átgondolható.

Munkámhoz a vizsgálati anyagot, a begyűjtött őzállkapcsok, fejek, illetve az úgynevezett kiskoponya lefűrészélése után megmaradt csonkolt koponyák alkották, a hozzátartozó legfontosabb adatokkal. Az állkapcsokat és a koponyákat az ország több élőhelyéről (Tolna, Győr-Moson-Sopron és Békés megyéből) gyűjtöttem be hivatásos vadászok, illetve vadászati felügyelők segítségével. Az állkapcsoknak és a koponyáknak a vizsgálatkor felvettem a korra utaló bélyegek adatait, elvégeztem a fogkopás mértéke alapján a korbecslést. A zápfogak cementállományát és a metszőfogak secundaer dentin- és cementállományát csiszolatkészítéssel technikával és hisztotechnikai módszerekkel vizsgáltam meg. Az így nyert adatok segítségével összehasonlítottam, és értékeltem a korbecslési módszereket, és a korra utaló bélyegeket.

A dolgozat legfontosabb megállapításai:

A **cementzónák** száma alapján az életkort a magyarországi habitatokban élő őzállomány esetében igen jól lehet becsülni. A vizsgált mintában minden esetben meg tudtam becsülni a kort az állkapocs fogainak preparátumaiból.

A csiszolat készítéses technikával a **pótdentin** alapján végzett korbecslés nem bizonyult alkalmazhatónak mivel a vizsgált mintában a pótdentint bemutató fogcsiszolat-preparátumok nem mutattak az életkorral kapcsolatba hozható rétegződéseket. Ellenben a szövettani vizsgálatok igen jól alkalmazhatónak bizonyultak a pótdentin értékelése során.

A **fogkopás** alapján végzett korbecslés, ha precízen végzik, nagyon szoros, statisztikailag igazolható korrelációt mutat a cementzónák alapján becsült korról. A bakoknál a különböző mintaterületeken a korrelációs koefficiens 0,9791; 0,9732; 0,9691 volt, míg a suták esetében ez az érték 0,9744.

A békési mintaterületen igen szoros statisztikailag igazolható kapcsolat volt kimutatható a cementzónák alapján becsült kor és a **terepen becsült kor** között is ( $r=0,9062$ ). A tolnai mintaterületen a korrelációs koefficiens értéke érdemben alacsonyabb volt ( $r=0,5911$ ), de az adatsorok közötti kapcsolat ez esetben is statisztikailag igazolható volt. A két mintaterületen tapasztalt eltérés oka a terepen dolgozó hivatásos vadászok felkészültségében rejlő különbség volt.

A cementzónák alapján becsült kor és a **trófeabírálati korbecslés** között közepes erősségű kapcsolat ( $r=0,6380$ ;  $0,4882$ ) volt kimutatható. Az adatsorok között nem túl markáns különbség mutatkozott meg, s ennek oka a vadászati felügyelők felkészültségének és tapasztalatának különbségeiből adódott.

A trófeabírálati korbecslés pontatlanságának okaiként megállapítható, hogy mivel a trófeabírálaton a kort legtöbbször az agancs jellege, a koszorúk és az



agancstő dőlése, a koponyacsont vastagsága és a koponyavarratok elcsontosodása alapján becsülik és ezek a tulajdonságok gyenge, legfeljebb közepes erősségű kapcsolatba hozhatók a korrallal, így az életkorra nem utalnak olyan mértékben, hogy ezek alapján pontos kort lehetne becsülni. Mindehhez hozzájárul a mínusz pontok elkerülésének lehetősége (erre a túlbecsült korok utalnak). Sokszor felületes a bírálathoz a kor megállapítása (erre az alul- és a túlbecslés is utal). A kiskoponyás trófea-bírálatkor jellemzően nem kötelező a levágott koponyarész bemutatása, tehát a fogkopás mértéke nem figyelhető meg, így nem lehet pontosítani a becsült trófea-bírálati kort.

A cementzónák alapján becsült kort és a **záfogak koronamagasságait** megvizsgálva megállapítható, hogy a legerősebb összefüggés az összes záfogak átlagainál tapasztalható, minden minta esetében ( $r=0,9519$ ;  $0,9423$ ;  $0,9347$ ;  $0,9323$ ). Igen erős összefüggés figyelhető meg az  $M_1$ -nél ( $r=0,9438$ ;  $0,9310$ ;  $0,9289$ ;  $0,9093$ ), az  $M_2$ -nél ( $r=0,9444$ ;  $0,9248$ ;  $0,9207$ ;  $0,9059$ ) és az  $M_3$ -nál ( $r=0,9432$ ;  $0,9211$ ;  $0,9042$ ;  $0,9006$ ). A becsült kor és a moláris fogkoronák magasságának korrelációs koefficiensei hol az egyik, hol a másik fog esetében mutatnak némileg magasabb értéket, de mivel különbségek elhanyagolhatóak megállapítható, hogy kapcsolatuk a cementum alapján becsült korrallal gyakorlatilag azonos szorosságúnak tekinthető. A  $P_3$ -nál kiszámított korrelációs koefficiensek értékei ( $r=0,8992$ ;  $0,8992$ ;  $0,8978$ ;  $0,8903$ ) mindegyik mintában meghaladták a  $P_2$ -nél számított koefficiensekét ( $r=0,8597$ ;  $0,8576$ ;  $0,8458$ ;  $0,7686$ ). Az egyik minta esetében nem volt kimutatható kapcsolat a cementzónák alapján becsült kor és a  $P_1$  fogkorona magassága ( $r=0,1285$ ) között. A másik három esetben a számított korrelációs koefficiens értékei meghaladták ugyan a számított kritikus együttható értékeit ( $r=0,3266$ ;  $0,2412$ ;  $0,2394$ ), de ezek a koefficiensek annyira alacsonyak, hogy gyakorlatilag nem tájékoztatnak az életkorról.

A cementzónák alapján becsült kor és az **I<sub>1</sub>-es fogak külső korona magassága** statisztikailag igazolható kapcsolatot mutat. A korrelációs koefficiens számított értéke ( $r=0,8564$ ;  $0,7747$ ;  $0,7323$ ;  $0,5847$ ) az őzsutáknál szoros, a bakoknál szoros, közepes és gyenge összefüggés is kimutatható volt a különböző élőhelyeken, annak ellenére, hogy az adatok átlag értékei érdemben nem tértek el egymástól.

A becsült kor és az **I<sub>1</sub>-es fogak fognyakhossza** esetében a korrelációs koefficiensek értékei ( $r=0,7046$ ;  $0,6007$ ;  $0,4921$ ;  $0,4629$ ) közepes illetve gyenge, de igazolható összefüggést mutatnak.

A becsült kor és az **I<sub>1</sub>-es fogak fogkorona/fognyak arányának** korrelációs koefficiensei ( $r=0,8368$ ;  $0,7678$ ;  $0,7048$ ;  $0,6700$ ) a fogkorona értékeinél alacsonyabbak, a fognyak vonatkozó korrelációs koefficienseinél ellenben magasabb értékeket mutatnak. Mindez alapján megállapítható, hogy a fogkorona/fognyak arány ismerete nem tájékoztat az életkorról jobban, mintha csak a fogkorona hosszát vesszük figyelembe.

A fogcsiszolatok alapján becsült kor és az **I<sub>1</sub>-es fogak lingualis felületén kialakult kopott** rész hosszának korrelációs koefficiensei ( $r=0,8790$ ;  $0,7923$ ;  $0,7199$ ;  $0,6002$ ) az őzsutáknál erős, a bakoknál közepes és gyenge összefüggéseket mutatnak. A suták esetében, ha elhagyjuk a fél évesek adatait, úgy ott is csak közepes erősségű korrelációs koefficiensst kapunk.

A becsült kor és az **I<sub>1</sub>-es fogak koronájának belső (lingualis)** magasságának korrelációs koefficienseinek értéke ( $r=0,8535$ ;  $0,7915$ ;  $0,7092$ ;  $0,5717$ ) a sutáknál erős, a bakoknál közepes és gyenge, statisztikailag igazolható összefüggést mutat. A suták adataiból, ha elhagyjuk a fél évesek értékeit, úgy a bakok adataihoz közelítő, közepes erősségű regressziót kapunk.

A cementrétegek alapján becsült kor és az **I<sub>1</sub>-es fogakon kialakult kopott rész és a korona egész nyelvi felülete arányának** korrelációs koefficiens értékei ( $r=0,8201$ ;  $0,8101$ ;  $0,7548$ ;  $0,6001$ ) közepes és gyenge, de statisztikailag igazolható regressziót mutatnak. A korrelációs koefficiens értéke a mintákban felerészt kismértékű emelkedést, felerészt kismértékű csökkenést mutat az I<sub>1</sub>-es fogak lingualis felületén kialakult kopott rész hosszának vonatkozó értékeihez képest, így megállapítható, hogy az I<sub>1</sub>-es fogakon kialakult kopott rész és a korona egész nyelvi felületének aránya nem tájékoztat pontosabban az életkorról, mintha csak a kopott rész hosszának adatait vizsgáljuk.

A cementum alapján becsült kor és az **I<sub>1</sub>-es fogak fogszögének** kapcsolatát jellemző korrelációs koefficiens számított értéke a bakok esetében csak a tolnai mintában és csak igen kis mértékben ( $r=0,2844$ ) haladja meg a kritikus értéket, ahol a mintaelemszám ( $n=345$ ) is igen magas volt. A másik két minta korrelációs koefficiense ( $r=0,1393$ ;  $0,1063$ ) nem éri el a 95 %-os megbízhatóság mellett a kritikus korrelációs koefficiens értékét, így ezekben az esetekben statisztikailag igazolható kapcsolat nem mutatható ki. Mindez azt jelenti, hogy a bakok metszőfogszöge egy éves kor felett gyakorlatilag nem növekszik.

A suták adatait vizsgálva megállapítható, hogy kis mértékben meghaladja a számított korrelációs koefficiens ( $r=0,3755$ ) a kritikus táblázati értéket, így gyenge statisztikailag igazolható kapcsolat megállapítható. A számításokat elvégeztem a fél évesek kihagyásával is, és ebben az esetben a korrelációs koefficiens ( $r=0,2156$ ) már alatta marad a kritikus értéknek. Ebből levonható az a következtetés, hogy a suták esetében egy éves kor után nem növekszik statisztikailag kimutatható módon az I<sub>1</sub>-es fogak szöge.

A fogcsiszolatok alapján becsült kor és a **mandibuláris fogsorhosszak** a bakok esetében a korrelációs koefficiens abszolút értéke ( $r=0,5763$ ;  $0,5411$ ;  $0,4301$ ) mindhárom esetben meghaladta a kritikus értéket, így a cementzónák alap-

ján becsült kor és a fogsorhosszak között gyenge kapcsolat volt igazolható a vizsgált mintákból. A suták teljes adatsorát vizsgálva kismértékben magasabb korrelációs koefficiens ( $r=0,6492$ ) számítottam ki. A félévesek adatainak elhagyásával ugyanezen érték már csak ( $r=0,4195$ ) volt.

A becsült kor és a **foghíjas szél** kapcsolatának értékelésekor a bakok esetében a számított korrelációs koefficiens értéke ( $r=0,3338$ ;  $0,2811$ ) éppen meghaladja a kritikus korrelációs koefficiens értékét. Így a cementum alapján becsült kor és a foghézag hossza között statisztikailag igazolható gyenge kapcsolat van a bakoknál. A suták teljes adatsora alapján számított korrelációs koefficiens értéke ( $r=0,7337$ ) közepes erősségű kapcsolatra utal. A félévesek kihagyásával számított ( $r=0,2866$ ) értéke jóval alacsonyabb, a bakokéhoz nagyon hasonló érték.

A fogcsiszolatok alapján becsült kor és a **szemlencse tömegek** korrelációs koefficienseinek értékei a bakok esetében ( $r=0,1703$ ;  $0,1738$ ;  $0,1752$ ) minden esetben alatta maradtak a kritikus korrelációs koefficiensnek, azaz ezek alapján megállapítható, hogy a vizsgált mintában statisztikailag igazolható kapcsolat e két paraméter között nem volt. Mindebből levonható az a következtetés, hogy a bakok esetében a szemlencse szárazanyag tartalmának növekedése egy éves korig erőteljes, azt követően statisztikailag elhanyagolható mértékű. A suták adatainak értékelése során számított korrelációs koefficiensek értékei jóval magasabbak ( $r=0,8438$ ;  $0,8349$ ;  $0,7694$ ), mint a bakok vonatkozó értékei. Ezek alapján a becsült kor és a szemlencse tömegek között közepes szorosságú, statisztikailag igazolható kapcsolat volt kimutatható. Ennek elsősorban az az oka, hogy a suták mintája tartalmazza a testileg nem kifejtett, fél éves egyedeket is és elsődlegesen ezeknek az egyedeknek köszönhető a relatív magas korrelációs koefficiens. A fentiek alapján megállapítható, hogy míg a bakok esetében a szemlencse szárazanyag-tömegének gyarapodása egy éves korra gyakorlatilag megáll, vagy csak rendkívül kis mértékben gyarapszik, addig a suták esetében ez a növekedés, ha kismértékben is de még évekig, körülbelül 5 éves korig elhúzódik.

Őzsuták vizsgálata során cementzónák és az **orrsövény** alapján RAJNIK (1977) szerint becsült kor között szoros statisztikailag igazolható kapcsolatot sikerült kimutatni. A korrelációs koefficiens értéke igen magas ( $r=0,8841$ ), a varianciák és középértékek statisztikailag nem különböznek. Mindezek alapján megállapítható, hogy a suták estében az orrsövény vizsgálata az életkorról jól tájékoztat.

A vizsgálataim reményeim szerint hozzájárulnak az őz biológiájának jobb megismeréséhez, korbecslésének objektívebb, egzaktabb kivitelezéséhez.

## 8. Tézisek

1. A cementzónák száma alapján az életkort a magyarországi habitatokban élő őzállomány esetében precízen lehet becsülni. A cementállomány növekedési zónái a fogcsiszolatokon is értékelhetőek, de egzaktabb a hisztotechnikai módszerekkel, elsősorban a Goldner-féle trikróm, a Heidenhain-féle azan és a Giemsa-féle festésekkel végzett vizsgálat.
2. Csiszolat készítéses technikával a pótdentin alapján végzett korbecslés az őz esetében nem alkalmazható eljárás, mivel a vizsgált mintában a pótdentint bemutató fogcsiszolat-preparátumok nem mutattak az életkorral kapcsolatba hozható rétegződéseket. Ellenben a szövettani vizsgálatok igen jól alkalmazhatóak, hasonlóképpen, mint a cementum esetében.
3. A fogkopás alapján végzett korbecslés, nagyon szoros, statisztikailag igazolható korrelációt mutat a cementzónák alapján becsült korrallal.
4. A cementzónák alapján becsült kor és a zápfogkoronák koronamagasságai – a P<sub>1</sub>-es-fogak kivételével – erős statisztikailag igazolható összefüggést mutatnak. A kapcsolat legerősebb az összes zápfog átlagánál, minden minta esetében. Igen erős összefüggés figyelhető meg az M<sub>1</sub>-, az M<sub>2</sub>- és az M<sub>3</sub>-as fogaknál.
5. A cementzónák alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak hosszúsági paraméterei statisztikailag igazolható kapcsolatot mutatnak.
6. A cementum alapján becsült kor és az I<sub>1</sub>-es fogak szöge nem mutat érdemi kapcsolatot, így e paraméter nem utal az életkorra.
7. A bakok esetében a szemlencse szárazanyag tartalmának növekedése egy éves korig erőteljes, azt követően statisztikailag elhanyagolható mértékű. Ellenben a suták esetében a szemlencse tömegének növekedése kb. 5 éves korig húzódik el.

8. Őzsuták esetében a cementzónák és az orrsövény alapján RAJNIK (1977) szerint becsült kor között szoros statisztikailag igazolható kapcsolat van. A suták esetében az orrsövény vizsgálata az életkorról jól tájékoztat.
9. Az élő őzön végzett terepi korbecslés elfogadható pontosságú eljárás, a gyakorlat igényeit kielégíti, de becslést végző személy szakmai tapasztalata, felkészültsége és precízsége alapvetően meghatározza módszer megbízhatóságát.
10. A trófeabírálati korbecslés – figyelembe véve azt a tényt, hogy adott esetben az eredménye alapján szankciót léptetnek érvénybe a vadással és a vadászatra jogosulttal szemben – nem elfogadható pontosságú. A cementzónák száma alapján becsült korról a vizsgálataink alapján átlagosan mindössze 37,6%-ban egyezett meg a trófeabírálati korbecslés.

## 9. Köszönetnyilvánítás

Elsőként néhai Prof. Dr. Kóhalmy Tamás egyetemi tanárnak tartozom köszönettel, aki hosszú évek óta támogatta munkámat, és bölcs tanácsaival irányította szakmai tevékenységemet.

Köszönettel tartozom Prof. Dr. Náhlik Andrásnak, az Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási Intézet egyetemi tanárának, tudományos vezetőmnek munkámhoz nyújtott önzetlen segítségért.

Hálával tartozom Prof. Dr. Faragó Sándor rektornak, intézetigazgató egyetemi tanárnak és Dr. Gergátz Elemér tanszékvezető egyetemi docensnek munkámat végig kísérő segítségükért, szakmai és emberi tanácsaikért, útmutatásaikért.

Köszönöm Prof. Dr. Benedek Pál intézetigazgató egyetemi tanárnak, munkahelyi vezetőmnek szakmai támogatását és, hogy laboratóriumot biztosított a jelentős zaj és porképződéssel járó csiszolatpreparátumaim elkészítéséhez.

Külön köszönettel tartozom Király István vadászati felügyelőnek, Giczi Ferenc vadászati igazgatónak és Vitális Mihály vadgazdamérnök hivatásos vadásznak, akik az anyaggyűjtésben nyújtottak pótolhatatlan segítséget.

Köszönöm B. Kissné Dr. Kelemen Gertrúd tanszékvezető egyetemi docensnek, hogy lehetőséget biztosított a szárítási és tömegmérési munkák elvégzésére.

Köszönöm segítségét Bognár Gábornak, az Országos Trófeabíráló Bizottság elnökének.



Köszönettel tartozom Dr. Somogyi Zoltánnak, az Erdészeti Tudományos Intézet Erdőművelési és Fatermesztési Osztály tudományos osztályvezetőjének, aki a sokszor nyújtott segítséget munkám során.

Köszönöm az ELTE TTK Állatszervezettani Tanszék, a Kőzettani és Geo-kémiai Tanszék és a SZIE Anatómiai és Szövetani Tanszék munkatársainak, különösen Dr. Zboray Gézának, Pálfia Zsoltnak, Pálfia Zsoltnénak, Dr. Szabó Csabának, Fall Andrásnak és Gombár Gabriellának, hogy lehetőséget biztosítottak a mikroszkópi preparátumok és a mikroszkópi fotók elkészítéséhez.

Köszönöm Fodor Jánosné laboránsnak és Némethné Wurm Katalinnak adminisztrátornak, hogy a mérési jegyzőkönyvek megírásával és legépelésével segítségemre voltak.

## 10. Irodalomjegyzék

1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról.
2. 30/1997.(IV.30.)FM rendelet.
3. 79/2004.(V.4.)FVM rendelet.
4. Ábrahám A. (1964): Összehasonlító állatszervezetan. Tankönyvkiadó. Budapest, 1055 p.
5. Aitken, R. J. (1975): Cementum layers and tooth wear as criterion for ageing Roe deer (*Capreolus capreolus*). *Journal of Zoology London* 175: 15-28.
6. Almasan, H. A. (1972): Untersuchungen der Zahnstruktur zur Alterbestimmung beim Rehwild (*Capreolus capreolus* L.) *Zeitschrift für Jagdwissenschaft*, 18: 222-224.
7. Andersen, J., Jensen, D. (1972): The weight of the eye lens in European hares known age. *Acta Theriologica*, 17: 87-92.
8. Angibault, J. M., Bideau, E., Vincent J. P., Quéré, J. P. et Kazraie (1993): Détermination de l'âge chez le Chevreuil (*Capreolus capreolus* L.) Test de critères morphologiques à partir d'animaux d'âge connu. *Mammalia*, 57: 4 579-587.
9. Ashby, K. R. and Henry, B. A. M. (1979): Age criteria and life expectancy of Roe deer (*Capreolus capreolus*) in coniferous forest in North-eastern England. *Journal of Zoology*, London 189: 207-220.
10. Bán I. (szerk., 1986): Élőhely és trófeavizsgálat számítógéppel. Akadémiai Kiadó. Budapest, 207 p.
11. Baráth Cs-né (szerk., 1996): Biometria. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 288 p.
12. Blase, R. (1960): Die Jägerprüfung. Neumann-Neudamm, Melsungen, 12. Aufl.
13. Blazis, A. S. (1971): A method of vital extraction of tooth in *Capreolus capreolus* for age determination. (In Russian with English summ.) *Zool. Zh.*, 50, 6: 926-929.

14. Brian, R. A. (1966): Determining age of white-tailed deer from layers in cementum of molars. *Journal of Wildlife Management*, 30, 1: 197-199.
15. Briel, W. (1979): Alterbestimmung nach Zahn- und Kiefermerkmalen an Siegerländer Rehböcken und Rothirschen und Rothirschen Sauerländer Sikahirschen. *Zeitschrift für Jagdwissenschaft*. 169-177 pp.
16. Broekhuizen, S. (1971): Age determination and age composition of hare populations. Union Intern. Biol. De Giber X. Congres, Paris, 477-489.
17. Brown, W. A. B. and N. G. Chapman, (1991): Age assessment of red deer (*Cervus elaphus*) from a scoring scheme based on radiographs of developing permanent molariform teeth. *Journal of Zoology London* 225: 85-97.
18. Carter, Richard J. (1998): Reassessment of Seasonality at the Early Mesolithic Site of Star Carr, Yorkshire Based on Radiographs of Mandibular Teeth Development in Red Deer (*Cervus elaphus*). *Journal of Archaeological Science* 25: 851-856.
19. Castel, R. W. (1975): Incremental growth zones in mammals and their archeological value. *Kroeber Anthropological Association Papers*, 47/48, 1-27.
20. Cederlund, G., Kjellander, P. and Stalfelt, F. (1991): Age determination of roe deer by tooth wear and cementum layers – test with known age material. Proceedings of XXth Congress of the IUGB, Gödöllő. 587-590. pp.
21. Charles, D. K., Condon, K., Cheverud, J. M. and Buikstra, J. E. (1986): Cementum annulation and age determination in *Homo sapiens* I: tooth variability and observer error. *American Journal of Physical Anthropology* 71, 311-320.
22. Chayen, J., Bitensky, L. and Butcher, R. G. (1973): Practical histochemistry. John Wiley and Sons, London.
23. Condon, K., Charles, D. K., Cheverud, J. M. and Buikstra, J. E. (1986): Cementum annulation and age determination in *Homo sapiens* II: estimates and accuracy. *American Journal of Physical Anthropology* 71, 321-330.
24. Coy, J. P., R. T. Jones and K. A. Turner, (1982): Absolute ageing of cattle from tooth sections and its relevance to archaeology. In B. Wilson, C. Grigson, and S. Payne (eds.) Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites: pp.127-140. Oxford: *BAR British Series* 109.

25. Csáki Á. (2002): Csontszövet. In: Röhlich P. (szerk.) Szövettan. Egyetemi tankönyv. Második, javított kiadás. Semmelweis Egyetem képzés-kutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ. Budapest
26. Dapson, R. W. (1980): Guidelines for statistical usage in age-estimation techniques. *Journal of Wildlife Management*. 44(3): 541-548.
27. Dellman D.H. (1993): Textbook of veterinary histology. 4th edition. Lea and Febiger, Philadelphia.
28. Douglas, M. J. W. (1970): Dental cement layers as criteria of age deer, in New Zealand with emphasis on red deer, *Cervus elaphus*. *N. Z. J. Sci.*, 13: 352-358.
29. Eidmann, N. (1932): Alterserscheinungen am Gebiss des Rothirsches (*Cervus elaphus* L.). *Mitt. Forstw. Forstwiss.* 3: 291-341
30. Erickson, J. A. and Seliger, W. G. (1969): Efficient sectioning of incisors for estimating ages of mule deer. *Journal of Wildlife Management*, 33, 384-388.
31. F. Nagy Gy. (1994): Biometria. Erdészeti és Faipari Egyetem, jegyzet. Sopron, 82 p.
32. Fancy, S. G. (1980): Preparation of Mammalia teeth for age determination by cementum layers: a review. *Wildlife Society Bulletin* 8(3): 242-248.
33. Faragó S. (1994): Vadászati állattan és etológia. Erdészeti és Faipari Egyetem, jegyzet. Sopron, 271 p.
34. Faragó S. (2002): Vadászati állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
35. Faragó S. - Náhlik A. (1997): A vadállomány szabályozása. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 315 p.
36. Fehér Gy. (1980): A háziállatok funkcionális anatómiája. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, 910 p.
37. Felek Zs. (1987): Az őz kormeghatározása a fog cementállományának növekedési vonalai alapján. Diplomamunka, GATE, Gödöllő.
38. Fisher, H. D. and MacKenzie, B. A. (1954): Rapid preparation of tooth sections for age determinations. *Journal of Wildlife Management*, 18: 535-537.
39. Gálné Sóllymos, K. (1997): Pásztázó elektronmikroszkópia és elektronsugaras mikroanalízis. Oktatási segédanyag. ELTE Közvetlen-Geokémiai Tanszék, Budapest.

40. Gilbert, F. F. (1966): Aging white-tailed deer by annuli in the cementum of the first incisor. *Journal of Wildlife Management* 30 (1): 200-202.0
41. Gordon, B. C. (1988): Of men and Reindeer herds in French Magdalenian Prehistory. Oxford: BAR Int. Ser. 390.
42. Gordon, B. C. (1993): Archaeological Tooth and Bone Seasonal Increments: The Need of Standardized terms and Techniques. *Archaeozoologia* V(2): 9-16.
43. Grue, H. E. (1976): Non-seasonal incremental lines in tooth cementum of domestic dogs (*Canis familiaris* L.) of known age. *Danish Review of Game Biology* 10 (2): 2-8.
44. Grue, H. E. and B. Jensen (1973): Annular structures in canine tooth cementum in red foxes (*Vulpes vulpes* L.). *Danish Review of Game Biology* 8 (7): 3-12.
45. Grue, H. E. and B. Jensen (1976): Annualar cementum structures in canine teeth in Arctic foxes (*Alopex lagopus* L.) from Greenland and Denmark. *Danish Review of Game Biology* 10 (3): 3-12.
46. Grue, H. E. and B. Jensen (1979): Review of the formation of incremental lines in tooth cementum of terrestrial mammals. *Danish Review of Game Biology* 11(3): 1-48.
47. Guzsál E. (1981): Háziállatok szövettana. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, 459 p.
48. Habermehl, K. H. (1985): Die Altersbestimmung bei Haustieren, Pelztieren und beim jagdbaren Wild. Berlin & Hamburg: Paul Parey.
49. Harris, S. (1978): Age determination in the Red fox (*Vulpes vulpes*) – an evaluation of technique efficiency as applied to sample of suburban foxes. *Journal of Zoology* London 184: 91-117.
50. Hewison, A. M. J., Vincent, J. P., Angibault, J. M., Van Laere, G. and Gaillard, J. M. (1999): Tests of estimation age from tooth wear on roe deer of known age: variation within and among populations. *Canadian Journal of Zoology* 77: 58-67. pp.
51. Hillson, S. (1986): Teeth. Cambridge: Cambridge University Press.
52. Hillson, S. and Bond, S. (1996): A scanning electron microscope study of bone, cementum, dentine, and enamel. In Bell, Fowler and S. Hillson (eds.), The experimental earth project, 1960-1992. CBA Research Report, York, Council of British Archaeology: pp. 185-195. English Heritage.

53. Hollósi G. (1995): Funkcionális állatanatómia II. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 426 p.
54. Hrabe, V. and Koubek, P. (1987): A comparison of some ageing methods in male Roe deer (*Capreolus capreolus*). *Folia Zoologica* 36(1):1-12
55. Husvéth F. (2000): A gazdasági állatok élettana az anatómia alapjaival. Mezőgazda Kiadó. Budapest 653 p.
56. Kay, M. (1974): Dental annuli age determination on white-tailed deer from archaeological sites. *Plains Anthropologist* 19: 224-227.
57. Kiedorf, U. and Beclner, J. (1997): Mineralization and wear of mandibular first molars in red deer (*Cervus elaphus*) of known age. *Journal of Zoology* London 241: 135-143.
58. Kiszely, Gy. és Barka, T. (1958) Gyakorlati mikrotechnika és hisztokémia. Medicina Könyvkiadó, Budapest.
59. Klein, P. G., C. Wolf, L. G. Freeman and Allwarden, K. (1981): The use of dental crown heights for constructing age profiles of red deer and similar species in archaeological samples. *Journal of Archaeological Science* 8: 1-32.
60. Klevezal, G. A. (1996): Recording Structures of mammals. Determination of Age and Reconstruction of Life History. English Translation. Rotterdam: A. A. Balkema.
61. Klevezal, G. A. and Kleinenberg, S. E. (1967): Age determination of mammals from annual layers in teeth and bone (Russian, translated into English 1969).
62. Kőhalmy T. (1999): Korbecslések. Szarvastól a siketfajdig. Nimród Alapítvány. Budapest, 110 p.
63. Kovács G. (1983): Survival pattern in adult European hares. *Acta Zoologica. Fennica*, 174: 69-70.
64. Kovács, G. és Felek, Z. (1991): Reliability of the cementum annuli count and the hunter's age determination in the roe deer. Proceedings of XXth Congress of the IUGB, Gödöllő. 587-590. pp.
65. Kovács Gy. - Heltay I. (1993): A mezei nyúl. Ökológia, gazdálkodás, vadászat. Hubertus Bt. és Magyar Mezőgazdaság Kft. Budapest, 177 p.
66. Krutsay, M. (1980): Szövetteni technika. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

67. Krutsay, M. (1999): Patológiai technika. Medicina Könyvkiadó, Budapest.
68. Kühnel, W. (1997): Szövettan. SH orvosi atlasz. Springer Hungarica Kft. Budapest, 521 p.
69. Kvaal, S. I., Solheim, T. and Bjerketvedt, D. (1996): Evaluation of Preparation, Staining and Microscopic Techniques for counting incremental lines in cementum of Human Teeth. *Biotechnic and Histochemistry* 71(4): 165-172.
70. Laws, R. M. (1952): A new method of age determination for mammals. *Nature* 169: 972-973.
71. Lesson, R. C. , Lesson, T. S. and Paparo, A. A. (1985) Textbook of histology. 5th edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia.
72. Lieberman, D. E. (1993): Life history variables preserved in dental cementum microstructure. *Science* 261: 1162.
73. Lieberman, D. E. (1994): The biological basis for seasonal increments in dental cementum and their application to archeological research. *Journal of Archeological Science* 21: 525-539.
74. Lieberman, D. E., Deacon, T. W. and Meadow, R. H. (1990): Computer image enhancement and analysis of cementum increment as applied to teeth of *Gazella gazella*. *Journal of Archaeological Science* 17: 519-33.
75. Lieberman, D. E. and Meadow, R. H. (1992): The biology of cementum increments (with an archaeological application). *Mammal Review* 22 (2): 57-77.
76. Lockard, G. R. (1972): Further studies of dental annuli for aging white-tailed deer. *Journal of Wildlife Management* 36 (1): 46-55.
77. Lord, R.D. (1959): The lens as an indicator of age in Cottontail Rabbits. *Journal of Wildlife Management* 23 358-360.
78. Low, W. A. and Cowan, I. McT. (1963): Age determination of deer by annular structure of dental cementum. *Journal of Wildlife Management* 27 (3): 466-471.
79. Lowe, V. P. W. (1967): Teeth as indicators of of age with special reference to red deer (*Cervus elaphus*) of known age from Rhum. *Journal of Zoology* London 152: 137-153.
80. Maringgele, F. J. (1979): Alterbetimmung beim Reh (*Capreolus capreolus* L.) und beim Rothirsch (*Cervus elaphus* L.) mit Hilfe der Trockenge-

- wichtsbestimmung der Augenlinse. *Zeitschrift für Jagdwissenschaft*, 24: 178-182.
81. Marosán M. (1999): A gímszarvas korbecslési módszereinek összehasonlító értékelése. Szakdolgozat. Soproni Egyetem. Sopron
  82. Marosán M. (2000): Korbecslési vizsgálatok gímszarvasnál. *Soproni Egyetem Tudományos Közleményei*, 46: 145-159. pp.
  83. Marosán M. (2001a): A gímszarvas egyes korbecslési módszereinek értékelése. *Vadbiológia*, 8: 43-48. pp.
  84. Marosán M. (2001b): Az őz (*Capreolus capreolus* /L./ 1758) egyes korbecslési módszereinek összehasonlító értékelése. Diplomamunka. NYME Mezőgazdaságtudományi Kar Mosonmagyaróvár.
  85. Marosán M. (in press): Az őz (*Capreolus capreolus* (L.) 1758) korbecslési módszereinek összehasonlító értékelése. *Nyugat-Magyarországi Egyetem Tudományos Közleményei*
  86. Marosán M., Gál J. és Náhlik A. (2003): Életkorbecslési vizsgálatok tapasztalatai őznel. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium 2003. Budapest.
  87. Marosán M. és Gergácz E (2001): Az őz (*Capreolus capreolus* /L./ 1758) egyes korra utaló morfológiai bélyegeinek vizsgálata. *Acta Agronomica Óváriensis*. 43/2: 113-126. pp.
  88. Marosán M. Gál J. és Király I. (2002): Data relating to the body measurement of female roe deer in Hungary. *Acta Agronomica Óváriensis*. 44/2: 141-147. pp.
  89. Marosi, S. és Somogyi S. (1990, szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földtudományi Kutató Intézet, Budapest.
  90. Mayhew, D. F. (1978): Age Structure of a Sample of Subfossil Beavers (*Castor fiber* L.), in P. M. Butler and K. A. Joysey (eds.) *Development, Function and Evolution of Teeth*. London: Academic Press.
  91. McEwan, E. H. (1963): Seasonal annuli in the cementum of teeth of Barren Ground Caribou. *Canadian Journal of Zoology* 41: 111-113.
  92. Meák G. - Szederjei Á. (1957): Adatok az elejtett őz korának meghatározásához. *Erdészeti Kutatások*. 1957/3-4, 267-274. pp.
  93. Miller, F. L. (1974): Age determination of caribou by annulation in dental cementum. *Journal of Wildlife Management*, 38 (1): 47-53.



94. Mitchell, B. (1963): Determination of age in Scottish red deer from growth layers in dental cement. *Nature* 198: 350-351.
95. Mitchell, B. (1967): Growth layers in dental cement for determining the age of red deer (*Cervus elaphus* L.). *Journal of Animal Ecology* 36: 279-293
96. Monks, G.G. and Robert J., (1993): Estimating season of death from growth increment data: a critical review. *Archaeozoology* V (2): 17-40.
97. Morris, P. (1972): A review of mammalian age determination methods. *Mammal Review* 2: 69-104.
98. Müller-Using, D. (é.n.). Rotwildalter-Merkblatt. Deutschen Jagdschutz-Verbandes.
99. Nagy E. - Puskás I. (1977): A fácán életkorának és koreloszlásának vizsgálata Magyarországon. *Nimród Fórum*: 10, 23-25. pp.
100. Nagy E. - Széky P. (1995): Vadászható és védett vadfajainkról. Nimród Alapítvány. Budapest, 225 p.
101. Náhlik A. (1996): Trófeakezelés és bírálat. Soproni Egyetem, jegyzet. Sopron, 114 p.
102. Nehring, A. (1903): Altersbestimmung von Reh- und Rotwild. *Wild und Hund*.
103. Németh A. és L Kiss A. (2002): Tápcsatorna. In: Röhlich P. (szerk.) Szövegtan. Egyetemi tankönyv. Második, javított kiadás. Semmelweis Egyetem képzéskutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ. Budapest
104. Pascal, M., Kovács G. (1983): La détermination de l'âge individuel chez le lièvre européen par la technique squelettochronologique. *Rev. Ecol.* 37: 173-186.
105. Pépin, D. (1973): Recherche d'âge chez le lièvre, *Lepus europeus*. *Ann Zool. Ecol. Anim.* 5: 271-281.
106. Pépin, D. (1974): Mise au point de techniques pour l'étude de populations de lièvre. *Bull. Office National de la Chasse*, 2: 77-119.
107. Pike-Tay, A. (1991): Red Deer Hunting in the Upper Paleolithic of South-West France: A Study in Seasonality. Oxford: *BAR Int. Ser.* 569.
108. Pike-Tay, A. (1995): Variability and Synchrony of Seasonal Indicators in Dental Cementum Microstructure of the Kaminuriak Caribou Population. *Archaeofauna* 4: 273-284.

109. Prior, J. (1968): The Roe Deer of Caranbone Chase. London: Oxford University Press
110. Quimby, D. C. and Gaab, J. E. (1957): Mandibular dentition as an age indicator in Rocky Mountain elk. *Journal of Wildlife Management*, 21: 435-451.
111. Rajnik, F. (1977): Új módszer az őz kormeghatározására. *Nimród Fórum* 12: 20-21.
112. Ransom, A. B. (1966): Determining the age of white-tailed deer from layers in cementum of molars. *Journal of Wildlife Management*, 30(1): 197-199.
113. Rice, L. A. (1980): Influence of irregular dental cementum layers on aging deer incisors. *Journal of Wildlife Management* 44 (1): 266-267.
114. Rieck, W. (1970): Alter und Gebissabnutzung beim Rehwild. *Zeitschrift für Jagdwissenschaft* 16: 1-7.
115. Robinette, W. L., Jones, D. A., Rogers, G. and Gashwiler, J. S. (1957): Notes on tooth development and wear for Rocky Mountain mule deer. *Journal of Wildlife Management*, 21(2): 134-153.
116. Röhlich P. (2002): A szövetek vizsgálatának módszerei. In: Röhlich P. (szerk.) Szövettan. Egyetemi tankönyv. Második, javított kiadás. Semmelweis Egyetem képzéskutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ. Budapest
117. Romeis, B. (1968): Mikroskopische Technik. R. Oldenbourg Verlag, München – Wien.
118. Saville, J. and Beattie, O. W. (1983): Analysis of Dental Annuli in Muskoxen (*Ovibos Moschatus*) as an Aid to the Determination of Archaeological Site Seasonality. *Canadian Journal of Archaeology* 3: 123-129.
119. Scheffer, V. B. (1950): Growth layers on the teeth of Pinnipedia as an indication of age. *Science* 112: 309-311.
120. Sergeant, D. E. and Pimlott, D. H. (1959): Age determination in moose from sections of incisor teeth. *Journal of Wildlife Management* 23(3): 315-321.

121. Severinghaus, C. W. (1949): Tooth development and wear as criteria of age in white-tailed deer. *Journal of Wildlife Management*, 13: 195-216.
122. Sohn, A. J. (1968): An evaluation of the dental annuli technique for determining age of white-tailed deer in Iowa. *Proc. Iowa Acad. Sci.*, 74: 72-77.
123. Sigrid, I. K., Solheim, T. and Bjerkevedt, D. (1996): Evaluation of Preparation, staining and microscopic techniques for counting incremental lines in cementum of human teeth. *Biotechnic and Histochemistry*, 71(4): 165-172.
124. Spinage, C. A. (1976): Incremental cementum lines in the teeth of tropical african mammals. *Journal of Zoology* London 178: 117-131.
125. Stallibrass, S. (1982): The use of cementum layers for absolute ageing of mammalian teeth: a selective review of the literature, with suggestions for further studies and alternative applications. In: B. Wilson, C. Grigson, and S. Payne (eds.) *Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites*: pp.109-126. Oxford: *BAR British Series* 109.
126. Sten, Sabine A. (1989): A method of age determination on archaeological and modern cattle (*Bos taurus*) by counting of tooth annuli in the cementum. *Laborativ Arkeologi* 5:195-199.
127. Stoneberg, R. P. and Jonkel, C. J. (1966): Age determination of black bears by cementum layers. *Journal of Wildlife Management*, 30: 411-414.
128. Szabik, E. (1973): Age estimation of roe-deer from different hunting-grounds of South-Eastern Poland. *Acta Theriologica*. 18, 12: 223-236. pp.
129. Szederjei Á. (1940a): Kormeghatározás: Az őznél. *Erdészeti Lapok*, 374-385. pp.
130. Szederjei Á. (1940b): Kormeghatározás: Az őznél (Befejező közlemény). *Erdészeti Lapok*, 427-432. pp.
131. Szederjei Á. (1955): Újabb módszerek az elejtett őz kormeghatározására. *Erdészeti Kutatások*, 1955/3. 135-147. pp.
132. Szederjei Á. (1959): *Őz*. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, 194 p.
133. Szederjei Á. (1960): *Szarvas*. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, 226 p.
134. Széky P. (1979): *Vadászati Állattan II. GATE, jegyzet*. Gödöllő, 342 p.
135. Szidnai L. (1978): *Trófeák kikészítése és bírálata*. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, 202 p.

136. Szikossy I., Marosán M. és Papp I. (2003): A fog cementállományának vizsgálata történeti embertani anyagon. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium 2003. Budapest.
137. Szunyoghy J. (1963): A magyarországi szarvas. Das ungarische Rotwild. (Kandidátusi értekezés), Magyar Természettudományi Múzeum, 193 p.
138. Thomas, D. C. and Bandy, P. J. (1973): Age determination of wild black-tailed deer from dental annulations. *Journal of Wildlife Management* 37 (2): 222-235.
139. Ueckermann, and Scholz, H. (1971): Zur Zahnentwicklung und Altersschätzung beim Sikawild (Sika nipon). *Zeitschrift für Jagdwissenschaft*, 17: 49-52.
140. Varga T. (1996): Az őzbak kormeghatározása. Nimród. 1996. április, 11-12 pp.
141. Vargha, A. (2000): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Pólya Kiadó, Budapest.
142. Víg B. - Kondics L. (1991): Összehasonlító szövettan. Tankönyvkiadó. Budapest, 377 p.
143. White, G. (1974): Age determination of roe deer (*Capreolus capreolus*) from annual growth layers in the dental cementum. *Journal of Zoology* London 174: 511-516. pp.
144. Wolfe, M. L. (1969): Age determination in moose from cemental layers of molar teeth. *Journal of Wildlife Management*, 33(2): 428-461.
145. Wood, A. J., Cowan, McT. and Nordan, H. C. (1962): Periodicity of growth in ungulates as shown by deer of the genus *Odocoileus*. *Canadian Journal of Zoology* 40(4): 593-603.

## 11. Táblázatok jelmagyarázata

Cement z. kor: cementzónák alapján becsült kor

x : átlag

s : szórás

r : számított korrelációs koefficiens

r\* : kritikus korrelációs koefficiens

r<sup>2</sup>: determinációs koefficiens

f.t. : a függvény típusa

lin. : lineáris

par. : másodfokú parabola

log.: logaritmus